

Duplicate
Lane Medical Library

ÜBER DIE HÄUFIGKEIT
SOGENANNTER
RACHITISCHER ZÄHNE
IN MECKLENBURG

INAUGURAL-DISSERTATION
ZUR ERLANGUNG DER
ZAHNÄRZTLICHEN DOKTORWÜRDE
AN DER
MEDIZINISCHEN FAKULTÄT
DER
HAMBURGISCHEN UNIVERSITÄT

VORGELEGT VON
ARTHUR DRECHSLER
REHNA 1931

DRUCK VON LEHMANN & BERNHARD
REHNA I. MECKL.

Referent Prof. Dr. Fischer

Im vergangenen Jahre erschien eine Arbeit von Schoengarth über die »Häufigkeitsfrequenz sogenannter rachitischer Zähne«. Verfasser untersuchte an der »Gemeinsamen Zahnklinik von Krankenkassen Bergedorfs und Umgebung« 3065 Personen und zwar wurden diese Untersuchungen nach der von Rohrer angegebenen Einteilung der Hypoplasien vorgenommen. Um die gefundenen Werte Schoengarths mit den diesbezgl. Verhältnissen in Mecklenburg zu vergleichen, habe ich ebenfalls an großem Material Untersuchungen über das Vorkommen sog. rach. Zähne angestellt.

Zunächst will ich erklären, was wir unter sog. rach. Zähnen zu verstehen haben; werde dann auf die Ätiologie der Schmelzhypoplasien eingehen und daran anschließend über meine erhobenen Befunde berichten.

Unter sog. rach. Zähnen sind solche Zähne zu verstehen, die Schmelzhypoplasien aufweisen. Die Bezeichnung »rachitisch« erklärt sich damit, daß man bei Individuen, die eine Rachitis durchgemacht haben, solche Veränderungen des Schmelzes sehr oft antrifft. Da jedoch durch Untersuchungen der Beweis erbracht worden ist, daß auch bei Personen, die niemals rachitisch erkrankt waren, sich rachitische Zahnveränderungen zeigten, so schlägt Rohrer vor, nur von »sogenannten rachitischen Zähnen« zu sprechen. Nach Kaufmann erklärt die Allgemeinmedizin die Bezeichnung Hypoplasie als »eine Störung in der Anlage eines Individuums oder Organes, die sich in Unterentwicklung kundtut«. Es handelt sich demnach bei den genannten Zähnen um mangelhafte Schmelzbildung, um Defekte im Schmelzüberzug, die zur Zeit der Bildung desselben zur Entwicklung gelangen, also beim Durchbruch der Zähne schon vorhanden sind.

Die Hypoplasien können wir im Schmelz in verschiedener Stärke und Form beobachten. Je nach der Intensität, in welcher die Schmelzdefekte auftreten, zeigt sich ein verschiedenes klinisches Bild. Rohrer teilt die Hypoplasien in eine Vorstufe

und drei Grade ein. Zur Vorstufe rechnet er die kreidig=weißen oder bräunlich=gelben Verfärbungen, von strich= oder bandförmiger Gestalt. Nach Türkheim handelt es sich bei den kreidig=weißen Verfärbungen um Störungen innerhalb des Schmelzes, ohne daß eine Verbindung dieser Defekte mit der Außenwelt besteht. Im Gegensatz hierzu entstehen die bräunlich=gelben Verfärbungen dadurch, daß infolge vorhandener Kommunikationen Speichel in den Schmelz gelangt und diese Verfärbungen verursacht. Diese Vorstufe findet sich an Zähnen, bei denen die Störung nur ganz gering gewesen ist, während die eigentlichen oder typischen Hypoplasien durch heftigere Entwicklungsstörungen verursacht werden.

Die leichteste Formveränderung ist der wellige Schmelz, bei dem die Oberfläche zwar noch glatt und glänzend erscheint, beim Hinüberfahren mit dem Fingernagel aber leicht Querriffelungen, Dellen und Absätze zu bemerken sind. Hier war die Störung des Kalkstoffwechsels nur gering.

Der zweite Grad ist charakterisiert durch Bildung von Pünktchen und Grübchen, die entweder ganz flach sind oder tief bis in das Dentin hineinreichen und einzeln vorkommen oder zu mehreren über die ganze Schmelzoberfläche des Zahnes unregelmäßig verstreut in Erscheinung treten. Befinden sich die punkt-tüpfel= oder napfförmigen Hypoplasien an den Höckern der Molaren, so gehen die Kauhöcker derselben durch die Kau= funktion verloren und die Kaufläche wird abgeflacht. Zeigen sich diese Veränderungen dagegen im unteren Viertel der Frontzähne, so kann die Schmelzlage derart geschwächt werden, daß die Schneidekante einbricht und ein gezacktes Aussehen aufweist. Durch Abrasio, worunter wir die durch den Kauakt entstandenen Defekte verstehen, können diese Auszackungen abgenutzt werden und Einkerbungen entstehen, die denen bei Hutchinsonschen Zähnen nicht unähnlich sind. Durch meine nachfolgenden Ausführungen über die Hutchinsonschen Zähne wird es jedoch nicht schwer sein, diese von sog. rach. Zähnen zu unterscheiden. Die Färbung dieser Grübchen ist gewöhnlich dunkler als der gewöhnliche Schmelz. Wird der ganze Schmelzüberzug von diesen Veränderungen des zweiten Grades befallen, so bekommt die Oberfläche des Zahnes ein zerklüftetes Aussehen. Die englischen

Forſcher bezeichnen die Veränderung als »honey combed teeth«, während die Franzoſen von »érosions en rugosités« ſprechen. Es iſt verſtändlich, daß dieſe Schmelzdefekte gute Retentionsſtellen für Speiſereſte, Schleim und Bakterien darſtellen und ſo die Cariesbildung begünstigen. In vielen Fällen finden wir die Grübchen auch in einer oder in mehreren wagerechten Reihen übereinander gelagert. Liegen die einzelnen Grübchen und Pünktchen eng zuſammen, ſo kommt es zur Bildung von Furchen. Dieſe Furchen, teils tiefer teils ſeichter, verlaufen um die ganze Zahnperipherie und laſſen darauf ſchließen, daß die Störung der Schmelzentwicklung, im Gegenſatz zu den Erſcheinungen des erſten Grades, eine heftigere geweſen ſein muß.

Der dritte Grad iſt von dem vorherigen nicht ſcharf abzugrenzen, ſondern unterſcheidet ſich von dieſem nur durch die größere Intenſität. Es ſind Fälle bekannt, bei denen die Schmelzbildung nur teilweise ſtatgefunden hat und Schoengarth beſchreibt einen Fall, bei dem die Frontzähne gänzlich ohne Schmelz waren, mit Ausnahme von dünnen Streifen am Zahnhals. Im allgemeinen ſind dieſe ſchweren Fälle aber ſehr ſelten.

Die oben beſchriebenen Grade können nun auch vergeſellſchaftet auftreten. So fand ich bei meinen Unterſuchungen (Fall 217, 333, 485 etc.) zuweilen die verſchiedenen Grade gleichzeitig und zwar zeigten die Zähne neben normalem Schmelz auch Rillen, Pünktchen, Grübchen und Furchen. Wir erklären uns dieſe Erſcheinung ſo, daß die normale Schmelzbildung durch ſtärkere oder geringere Störungen unterbrochen worden iſt. »Es können alſo mehrere Störungswellen mit normalen Intervallen vorhanden ſein, welche dann jeweils an den Zähnen Beweiskraft erhalten«. (Rohrer.)

Die Schmelzhypoplaſien ſind bereits ſeit langer Zeit bekannt. Schon frühzeitig nahm man als Urfache eine Allgemeinerkrankung an, da die Hypoplaſien nicht nur einzelne Zähne befielen, ſondern an allen Zähnen der gleichen Bildungsperiode beobachtet wurden. Türckheim gibt in ſeiner Arbeit »Zur Kenntnis der Schmelzhypoplaſien« einen geſchichtlichen Überblick, dem ich die nachfolgenden Daten entnehme. Danach iſt es Ambroïſe Paré (1517–90), der als erſter auf die Hypoplaſien aufmerkſam macht. Zu gleicher Zeit erſchien in Frankreich ein Buch von Fauchard,

in dem die Hypoplasien erwähnt werden. Dann folgt eine Arbeit von Bumon, die sich mit den Erosionen befaßt. Im Jahre 1780 berichtet John Hunter »von derjenigen Verderbnis der Zähne, die von der Entblößung ihrer Substanz entstehet«. La Forge (1803) glaubt, daß neben scharfer Säfte und Säuren die Kinderkrankheiten die Entstehung der Erosionen bedingen. Dieselbe Ansicht vertritt auch Serre (1804). Linderer (1842) lehnt die schädigende Einwirkung von Säuren und Feuchtigkeiten ab und sieht in der Rachitis und »Scropheln« die Ursache der Schmelzdefekte, doch müssen auch andere Krankheiten die Entstehung der Hypoplasien verursachen können, da er »schon bei Skeletten, die von Rachitis aufs höchste entstellt waren, doch die Zähne sehr gut angetroffen habe«. Dann folgen Arbeiten von Carabelli (1844) und John Tomes (1859). Baume, der Hypoplasien bei Affen festgestellt hat, vertritt den Standpunkt, daß die Schmelzanomalien auf Ernährungsstörungen beruhen.

Bei älteren Forschern ist vielfach von »Erosion« die Rede, auch trifft man häufig die Bezeichnung »Atrophie« und zwar besonders in der ausländischen Literatur. Black bezeichnet noch im Jahre 1914 in seiner »Konstervierenden Zahnheilkunde« die Schmelzdefekte als Atrophie. Zsigmondy ist der erste, der die Bezeichnung »Hypoplasie« einführt.

Während die Ansicht der ältesten Forscher dahin ging, daß irgend eine beliebige Krankheit, die das Individuum zur Zeit der Zahnentwicklung durchmacht, für die Ursache der Hypoplasien gelten könne, war es zuerst Hutchinson, der eine bestimmte Entstehungsursache der Schmelzhypoplasien annahm. Er hielt nämlich die halbmondförmigen Einkerbungen an den Schneidekanten der oberen mittleren Schneidezähne für Folgen einer Lues hereditaria. Parot dagegen sieht nicht nur in diesen Anomalien, sondern in allen Hypoplasien überhaupt die Folgen einer kongenitalen Lues. Ganz anderer Ansicht sind Magitôt und Busch. Nach ihrer Meinung ist die Eklampsia infantum, die mit der Tetanie häufig kombiniert auftritt, für die Entwicklungsstörungen des Zahnschmelzes verantwortlich. Man versteht unter dieser Erkrankung die schweren Folgen der Krämpfe im Kindesalter. Nach Feer sind es »Anfälle von lokalisierten oder universellen Muskelzuckungen mit Bewußtseinsverlust«, die auf

Anomalien im Kalkstoffwechsel beruhen, bedingt durch endokrine Drüsenstörungen. Nach Queft ist das Gehirn spasmophiler Kinder kalkarmer als das normaler Säuglinge, und Schabad konnte im Stoffwechselversuch zeigen, daß spasmophile Kinder eine negative Kalkbilanz aufweisen.

Die klinischen Erscheinungen der Konvulsionen sind: Bewußtseinschwund, die Pupillen zeigen keine Reaktion, auch Hautreize werden nicht empfunden, der Puls ist beschleunigt und weist Unregelmäßigkeiten auf. Der Gesichtsausdruck ist starr oder von heftigen Zuckungen verzerrt. Solche Krampfercheinungen dauern gewöhnlich nicht länger als 2—3 Minuten.

Busch glaubt, daß nur ein einziger eklamptischer Anfall ausreichend ist, um Hypoplasien zu erzeugen.

Rattier, ein Schüler von Magitôt, sieht ebenfalls in den Kramp fzuständen die Hauptursache dieser Anomalien.

Während Berten wieder jeder Krankheit, die Ernährungsstörungen hervorrufen kann, die Fähigkeit zuschreibt, Defekte im Schmelz zu erzeugen, glaubt Parreidt als ätiologisches Moment für die Schmelzanomalien sowohl Darmkatarrh als auch Rachitis ansehen zu müssen.

Black bespricht in seinem oben genannten Werk unter Heranziehung von Fällen aus seiner Praxis, die vorkommenden Formen von Hypoplasien. Er glaubt, daß Allgemeinerkrankungen, manchmal vielleicht auch lokale Ursachen, allerdings unbekannte, für die Ätiologie der Defekte wesentlich sind.

Neumann, Eichler und andere Forscher sahen in der Rachitis allein die Ursache der Hypoplasien. Namentlich Röse vertritt energisch die Ansicht, daß die hypoplastischen Schmelzdefekte als Folge der Rachitis anzusehen sind. Nach ihm ist die Schmelzhypoplasie eines der sichersten und auffälligsten Zeichen einer durchgemachten Rachitis. Röse behauptet außerdem auf Grund seiner Untersuchungen, daß Stillungsdauer und Rachitis in engem Zusammenhang stehen. Er sagt darüber: »Je länger die Kinder gestillt worden sind, um so seltener leiden sie an rachitischen Schmelzbildungen«.

Die Stellungnahme der oben genannten Autoren ist zu verstehen, wenn wir berücksichtigen, daß die Rachitis als chron. Wachstumskrankheit nicht nur am Knochen system deutliche Er-

scheinungen hervorruft, sondern auch zu Formveränderungen der Kiefer führt und den Zahndurchbruch ungünstig beeinflusst. Daß diese Kieferveränderungen, die sich in Verkürzung des Unterkiefers und Verlängerung und Verschmälerung des Oberkiefers auswirken, einen Einfluß auf die Zahnstellung haben müssen, ist erklärlich.

Fleischmann dagegen lehnt diesen Standpunkt ab. Er bestreitet keineswegs, daß die Rachitis auf die Zahnentwicklung schädigend einwirkt, aber der Zusammenhang zwischen Rachitis und Dentition besteht nur bezüglich des Dentins. Nach seiner Ansicht kann die Rachitis schon deshalb nicht als hauptsächlichstes ätiologisches Moment für die Schmelzdefekte angesehen werden, weil dann das große Mißverhältnis zwischen Häufigkeit der Rachitis und der der Hypoplasien nicht zu erklären wäre. Fand man doch in 60–70 % Rachitis, während Hypoplasien in 2–7 % festgestellt wurden. Von den Anhängern der Rachitistheorie wird dieses Mißverhältnis damit erklärt, daß es zur Beteiligung der Zähne nur bei ausgesprochener Kieferrachitis kommt. Diese Erklärung läßt Fleischmann jedoch nicht gelten. »Denn wir wissen, daß in den meisten Fällen die Rachitis die Entwicklung der Zähne beeinflusst, und ich habe nachgewiesen, daß in allen Fällen von Rachitis ganz charakteristische Veränderungen im Dentin auftreten. Ist also das Dentin bei Rachitis immer mit-ergriffen, warum sollte wohl der Schmelz so viel seltener befallen sein?« Fleischmann fand weiter, daß gerade diejenigen Zähne keine Hypoplasien zeigen, deren Verkalkung in die Lebensjahre fällt, in denen die Rachitis am häufigsten in Erscheinung tritt.

Die Verkalkungszeiten der Zähne sind namentlich von Pierce untersucht und graphisch dargestellt worden. Danach beginnt die Milchzahnverkalkung in der 17. Fötalwoche und zwar setzt sie gleichzeitig an den Eckzähnen und Schneidezähnen ein. Die Milchmolaren beginnen in der 18. Fötalwoche mit der Verkalkung. Zur Zeit der Geburt sind die Kronen der Schneidezähne und Eckzähne annähernd vollständig, die der Molaren bis zur Hälfte in Hartsubstanz umgebildet worden. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres etwa ist die Verkalkung der Milchzähne vollendet. Die Kalzifikation der bleibenden Zähne vollzieht sich zur Hauptsache nach der Geburt. Fleischmann verlegt den

Beginn der Verkalkung der bleibenden Zähne in das erste Lebensjahr. Auch nach Kranz beginnt die Verkalkung gegen Ende des ersten Halbjahres nach der Geburt. Nur die Kronenspitzen des ersten Molaren verkalken während des intrauterinen Lebens. Im sechsten Lebensjahr ist die Krone des mittleren Schneidezahnes und des ersten Molaren ganz verkalkt, die des seitlichen Schneidezahnes fast vollständig, die Eckzahnkronen gut zu $\frac{2}{3}$, die Krone des ersten Prämolaren annähernd zur Hälfte, während bei dem zweiten Prämolaren $\frac{1}{3}$ seiner Krone verkalkt ist. Im 12. Lebensjahr ist die Verkalkung der bleibenden Zähne ungefähr durchgeführt, mit Ausnahme der Wurzelspitze des Eckzahnes und der Wurzeln des zweiten und dritten Molaren. Mit den Wurzeln des Weisheitszahnes findet die Verkalkung nach dem 18. Lebensjahre ihren Abschluß.

Ich will nun weiter auf die Ausführungen Fleischmann's zur Widerlegung der Rachitistheorie eingehen. Er weist darauf hin, daß die Rachitis chronischen Verlauf nimmt. Dann muß aber auch der schädigende Einfluß auf die Zähne ein fortwahrer sein. Die Tatsache aber, daß die Zähne neben hypoplastischen Schmelzpartien meistens auch Zonen mit normalem Schmelz zeigen, beweist den intermittierenden Charakter der verursachenden Krankheit. Diese Feststellung jedoch widerspricht gerade dem chronischen Verlauf der Rachitis. Knochen und Dentin sind mesodermalen Ursprungs und sind deshalb verwandte Gewebe. Anders aber steht es mit dem Schmelz, da dieser vom Ektoderm abstammt. Fleischmann untersuchte makro- und mikroskopisch die Kiefer von 20 Fällen, bei denen klinisch und anatomisch Rachitis festgestellt war. In allen Fällen waren im Dentin die für Rachitis charakteristischen Veränderungen enthalten und nur zweimal fand er Schmelzhypoplasien. Bei mehreren Versuchsobjekten wurden ganz schwere rachitische Dentinveränderungen nachgewiesen, während der Schmelz vollständig entwickelt war. »Es bleibt also kaum etwas anderes übrig, als anzunehmen, daß in den zwei positiven Fällen zur Rachitis noch etwas hinzugekommen sei, das für die Entwicklung der Hypoplasien maßgebend war«.

Anfang der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts beobachteten Kocher und Reverdin nach Exstirpation der Schild-

drüse das Auftreten von Cachexia strumipriva, eines Krankheitsbildes, das sich äußert in Zwergwuchs, geistiger Schwäche, Verdickung der Haut, spärlichem Haarwuchs, Verbildung der Nase und Lippen. Im Anschluß an diese Beobachtungen unternahmen auch andere Forscher wie Hoffmeister, Christiani, Trouxeau, Biedl und Bayon ähnliche Tierversuche. Biedl fand bei thyreoidektomierten Hunden mangelhafte Zahnentwicklung und Bayon stellte fest, »daß die Thyreoidektomie eine ganz erhebliche Verlangsamung der Frakturheilung beim Kaninchen bedingt«. Weiteres konnten die genannten Autoren an den Zähnen ihrer thyreoidektomierten Tiere nicht finden.

Sehr eingehend beschäftigte sich Kranz mit diesen Untersuchungen und der Frage, ob die Thyreoidektomie die Zahn- und Kieferentwicklung beeinflussen könne. Zu diesem Zwecke untersuchte er die Kiefer und Zähne bei zahlreichen Kretinen und kam zu dem Ergebnis, daß bei Kretinen nicht nur die Stellungsanomalien sehr zahlreich sind, sondern auch Zahn- und Kieveränderungen häufig in Erscheinung treten. Außerdem stellte er verlangsamte Dentition und mangelhafte Struktur der Zähne fest. Durch diese Untersuchungen, verbunden mit Versuchen an thyreoidektomierten Schweinen und Kaninchen konnte Kranz einen Zusammenhang zwischen Schilddrüse, Kieferbildung und Dentition beweisen.

Bei diesen zahlreichen Experimenten über die Ausfallerscheinungen bei Schilddrüsenexstirpation, die wie bereits angeführt, von vielen Autoren vorgenommen worden sind, wurde namentlich von Vassale und Generali der Beweis erbracht, daß der Verlust der Epithelkörperchen Tetanie hervorruft, selbst bei Erhaltung der Glandula thyroidea. Biedl war der erste, der die vollständige Unabhängigkeit der Epithelkörperchen nachweisen konnte und machte darauf aufmerksam, daß Tetanie und Kachexie eine gesonderte Genese haben und zwar beruht die Tetanie auf dem Ausfall der Epithelkörper, während die Kachexie auf Störungen der Schilddrüsenfunktion zurückzuführen ist.

Durch die Untersuchungen von Erdheim erfährt die Ätiologie der Schmelzhypoplasien eine Änderung. Durch Entfernung der Epithelkörperchen, die zuerst von Sandström beschrieben worden sind, konnte Erdheim an Ratten außer dem

Auftreten rachitischer Knochenerrscheinungen schwere trophische Veränderungen an den Nagezähnen feststellen, und zwar handelt es sich bei diesen Veränderungen um ungenügende Verkalkung. Hierdurch wurden die Zähne geschwächt und frakturierten. Während die Nagezähne gesunder Ratten gelblich durchscheinend sind, zeigten sich bei den parathyreoidektomierten Tieren an der mit Schmelz überzogenen konvexen Seite der Schneidezähne opak=weiße Flecke, die allmählich an Ausdehnung immer mehr zunahmen und mit dem Längenwachstum der Zähne gegen die Spitzen vorrückten, um nach Hinterlassung circumscripter Bildungsfehler in Gestalt grubiger Schmelzdefekte zu verschwinden. Zur Sicherung feiner Untersuchungsergebnisse machte Erdheim auch den Gegenversuch, indem er durch Autotransplantation von Epithelkörper den Kalkmangel aufhob.

Auf Grund dieser Untersuchungen und der Tatsache, daß die pathologisch=anatomischen Bilder mit denen menschlicher Zahnhypoplasien völlig übereinstimmen, stellte Fleischmann die Hypothese auf, daß die Schmelzdefekte eine Folge der infantilen Tetanie wären. Wie ich bereits erwähnte, wies schon Magitot auf diese Zusammenhänge hin, indem er für die Genese der Hypoplasien die Eklampsie verantwortlich machte, die ja bekanntlich zum Sympton=Komplex der Tetanie gehört. Fleischmann kam zu seiner Ansicht aus nachfolgenden Überlegungen:

1. Eine Krankheit, die durch Störung der Epithelkörperchenfunktion hervorgerufen wird, ist die Tetanie.
2. Bei dieser Erkrankung werden die Gebilde ektodermaler Herkunft stark in Mitleidenschaft gezogen. Vom Ektoderm stammen ab: Nägel, Haare, Linse und — was uns hier besonders interessiert — die Zähne.
3. Die Tetanie hat intermittierenden Charakter, wodurch das abschnittsweise Auftreten der Schmelzhypoplasien zu erklären ist.
4. Die Kindertetanie tritt meistens während der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres in Erscheinung, also zu dem Zeitpunkt, in den die Entwicklung der Zähne fällt, die am häufigsten Hypoplasien zeigen.

An 10 Fällen, die zur Zeit der Zahnentwicklung an Tetanie litten, konnte er ausnahmslos Hypoplasien nachweisen. Wenn

diese Beweisführung Fleischmann's für den Zusammenhang der Schmelzdefekte mit Tetanie auch einleuchtet, so sind in der Literatur jedoch zahlreiche Fälle bekannt, deren Anamnese »das sichere Fehlen manifester Zeichen von Tetanie ergibt«.

Helbig, der die Ansicht Fleischmann's bestätigt, untersuchte 10jährige Schülerinnen, um die Beziehung zwischen Hypoplasie und Spasmophilie und Hypoplasie und Rachitis festzustellen und fand bei rachitischen Kindern 84,3 Prozent Hypoplasien, bei nichtrachitischen dagegen nur 9,5 Prozent. Außerdem untersuchte er 32 Kinder, die früher an Krämpfen litten. Von diesen 32 Mädchen zeigten 66 Prozent Schmelzdefekte, obgleich 17 von ihnen keine Spuren einer überstandenen Rachitis aufwiesen. Helbig kommt zu dem Ergebnis, daß die Stärke der Hypoplasien »viel weniger von der Rachitis als von Krämpfen abhängig erscheint«.

Erwähnen möchte ich noch die pathologisch-anatomische Arbeit von Preiswerk-Maggi, die sich mit der Wirkung der Parathyreoidektomie beschäftigt. Nach dem Vorbild von Erdheim wurden auch hier Versuchsratten die Epithelkörperchen entfernt. Von 10 Ratten zeigten alle deutliche Veränderungen an den Nagezähnen und zwar wurden bei 5 Versuchstieren Einkerbungen und Vertiefungen an den Schneidezähnen nachgewiesen, während die Zähne der übrigen Ratten Verfärbungen und Abrasio zeigten, hervorgerufen durch die mangelhafte Kalzifikation.

Im Anschluß an die Versuche von Erdheim und Fleischmann hat auch Toyofuku Untersuchungen an den Zähnen der parathyreoidektomierten Ratte angestellt. Er beschreibt in ausführlicher Weise die Veränderungen an Pulpa, Dentin und Schmelz und kommt im allgemeinen zu denselben Resultaten.

Hohlbaum, dessen Untersuchungen von denen der genannten Forscher im wesentlichen nicht abweichen, schreibt »gleichzeitig kann ich bestätigen, daß die überlebenden Tiere gegenüber den Kontrolltieren von demselben Wurf im Körperwachstum etwas zurückbleiben«. Ein abschließendes Urteil kann er nicht fällen, da sein untersuchtes Material zu klein ist. Auffallend ist jedoch, daß die Knochen keine Abweichungen vom normalen Aufbau

der Knorpelwucherungszone zeigten, während die Nagezähne schwere Veränderungen aufwiesen.

Kranz unterzog die Untersuchungen von Erdheim und Fleischmann einer eingehenden Prüfung. In umfangreicher Arbeit studierte er den Einfluß aller endokrinen Drüsen auf die Dentition und kommt zu dem Ergebnis, daß nicht nur die Epithelkörperchen auf die Zahnbildung einen Einfluß ausüben, sondern mehrere evtl. alle Drüsen mit innerer Sekretion für die Entwicklung der Zähne von Bedeutung sind.

Besonderes Interesse brachte er auch den Zahnanomalien bei kongenitaler Lues entgegen, den sog. Hutchinsonschen Zähnen. Die Wissenschaft versteht darunter Zähne — in erster Linie die oberen mittleren Incisivi — deren seitliche Kronenränder nicht, wie bei normalen Schneidezähnen divergieren, sondern nach der Schneide zu konvergieren. Die charakteristische Schaufelform ist zur »Pflockform« (Jürgens) umgewandelt. Die Kronenlänge ist verkürzt und in der Breite verkümmert, wodurch zwischen den einzelnen Zähnen Lücken entstehen. An der Schneidefläche zeigt sich häufig eine halbmondförmige Ausbuchtung, die aber von Schmelz überzogen sein muß (Rohrer) und die mesialen und distalen Kanten sind anomal abgerundet. Das untere Drittel des Hutchinsonschen Zahnes zeigt im Querschnitt die Form einer Ellipse, während der normale Schneidezahn bei demselben Schnitt ein Viereck mit abgerundeten Ecken darstellt. Die Entstehungsursache der Hutchinsonschen Zahnveränderungen ist in einer fötalen Schädigung des mittleren Zahnteils zu suchen. Normalerweise besteht der Schneidezahn aus drei Leisten in senkrechter Anordnung. Durch die erwähnte Schädigung der mittleren rücken die beiden Seitenleisten zusammen und geben dem Zahn die tonnenförmige Gestalt. Je nach der Heftigkeit der schädigenden Einwirkung auf die Mittelleiste bildet sich die halbmondförmige Auskerbung stark, gering oder gar nicht aus.

Kranz untersuchte annähernd 100 Fälle, von denen 60 an Lues erkrankt waren. Er konnte in den Schnittpräparaten der Zahnkeime kongenitale Luische niemals Spirochäten entdecken, die Cavallaro, Passini und Walkhoff gefunden haben wollen. Wohl aber gelang es ihm, die Befunde der genannten Autoren

an denjenigen luischen Patienten zu bestätigen, bei denen nachweislich Thymus- und Schilddrüsenerkrankungen vorlagen. Er kann sich die Untersuchungsergebnisse der erwähnten Forscher nur so erklären, daß sie ausschließlich nur mazerierte Föten untersuchten, die an Spirochätensepsis gestorben sind, »bei denen es also keine außerordentliche Erscheinung sein dürfte, wenn sich auch gelegentlich Spirochäten im Zahnkeim eingefunden hätten«. Kranz weist darauf hin, daß in der Literatur verschiedentlich Fälle beschrieben wurden, bei denen bestimmt keine Lues vorlag und trotzdem Schmelzhypoplasien sich fanden, während anderseits sehr viele sichere Luesfälle keine Zahnanomalien zeigten. Nach Vergleich seiner Befunde bei Luesfreien und Luischen mit denen bei Kretinen kommt er zu folgendem Ergebnis. Weder bei Kretinen und Luischen noch bei Syphilisfreien zeigten sich besonders charakteristische Hypoplasien. Auch die von Zinßer für luische Kennzeichen angesehenen Hypoplasien an den Kauflächen der ersten Molaren und die von H. Pflüger beschriebene typische Knospenform läßt Kranz als charakteristisch für Lues congenita nicht gelten. Ein syphilitisches Virus kommt als direkte Ursache der Schmelzanomalien nicht in Frage, wohl aber Erkrankungen der Glandula thyreoidea. Sowohl der Hutchinsonsche Zahn als auch die Hypoplasien beruhen auf Dysfunktion des inneren Drüsenapparates.

Diesen Standpunkt vertritt auch Riecke, der darauf aufmerksam macht, daß die sog. Hutchinsonsche Trias (Keratitis parenchymatosa, Labyrinthtaubheit, halbmondförmige Ausbuchtung an der Schneidefläche der mittleren oberen Incisivi) zur Sicherung der Diagnose bei kongenitaler Lues nur mit Vorzicht herangezogen werden darf, denn Keratitis parenchymatosa zeigt sich ebenfalls bei der Tuberkulose und die angeführten Auskerbungen an den Schneidezähnen dürfen nicht mit den Hypoplasien verwechselt werden, die sich häufig bei Rachitis zeigen. »Neue Untersuchungen scheinen übrigens zu ergeben, daß eine nur für Lues charakteristische Zahnveränderung überhaupt nicht existiert. Es kommen die verschiedensten Entwicklungsstörungen und Deformierungen der Zähne vor, die sich aber von rachitischen, kretinistischen nicht unterscheiden. Wahrscheinlich beruhen sie überhaupt nicht auf einer direkten

Schädigung der Zahnkeime durch das Kontagium, sondern auf einem durch Erkrankung endokriner Drüsen gestörten Kalkstoffwechsel«.

Berten glaubt an einen Zusammenhang von Lues und Hypoplasien. Der Hutchinsonsche Zahn ist aber nicht charakteristisch für Syphilis; zeigen sich jedoch andere Zeichen luischer Infektion, so kann er zur Unterstützung der Diagnose herangezogen werden.

Heymann untersuchte 5162 Schulkinder von 7—13 Jahren und fand angeblich bei 45 Kindern Zahnanomalien, die auf Lues schließen ließen. Von diesen 45 Fällen zeigten 6 Kinder charakteristische Hutchinsonsche Zähne. Kranz konnte bei 60 congenitalen Patienten nur einen einzigen Fall mit typischen Hutchinsonszähnen beobachten. Der Hutchinsonsche Zahn ist demnach also gar nicht so verbreitet wie man immer vermutet.

Im Jahre 1920 erschien von Gottlieb eine Arbeit, in der er zu dem Thema Schmelzhypoplasien und Rachitis Stellung nimmt. Seinen Ausführungen ist zu entnehmen, daß die Störung der Kalkablagerung das Hauptmoment für die Entstehung der Schmelzdefekte ist und daß die Tetanie mit der Kalkarmut in einem engen Zusammenhang stehe und stets die Rachitis begleitet. Der Ansicht, daß ein Gegensatz zwischen der Tetanie- und Rachitisätiologie besteht, könne nicht zugestimmt werden.

Zu erwähnen wäre noch die Infektionstheorie, die ihre Verfechter besonders in Joseph Koch und Walkhoff findet. Koch unternahm am Berliner Institut für Infektionskrankheiten Experimente an jungen Hunden. Er injizierte ihnen in die Blutbahn $1\frac{1}{2}$ —3 ccm einer 24 Stunden alten Serumbouillonkultur von Streptokokken. Von den resultierenden Erscheinungen dieser Versuche interessieren uns im Rahmen dieser Arbeit nur die Zahn- und Kieferveränderungen, die er bei einer Anzahl von Versuchstieren beobachten konnte und zwar zeigten sich neben Verdickung der Kieferknochen starke Karies, Zahnausfall und Schmelzhypoplasien. Auf Grund der Kochschen Berichte über diese Experimente und infolge eigener Untersuchungen kommt Walkhoff zu der Anschauung, daß das Primäre an dem eigentlichen pathologischen Prozeß die infektiöse Zellschädigung

ist und nicht der Mangel an Erdsalzen während der Zahnentwicklung. Er sagt: »Ich bin nach den Mitteilungen Koch's, ferner nach den mikroskopischen Bildern vieler Strukturfehler und nach den Beobachtungen der Praxis geneigt, der Infektionstheorie eine weit größere, ja in vielen Fällen ausschlaggebende Bedeutung für die Entstehung von Strukturanomalien zuzumessen, als wie es bisher geschehen ist. Andererseits sollen damit nicht die Untersuchungen über die Bedeutung der inneren Sekretion für die Entstehung der Zahnanomalien herabgesetzt werden. Es erscheint mir wahrscheinlich, daß die Infektion und die innere Sekretion in einem gewissen Zusammenhange für den Effekt, nämlich für die Entwicklung von Strukturfehlern der Zähne stehen.«

Tholuck erwähnt in einer im Jahre 1925 erschienenen Arbeit das häufige Vorkommen von Hypoplasien des Zahnschmelzes bei Skrofulose, worunter eine bestimmte Form der kindlichen Tuberkulose zu verstehen ist. Er untersuchte skrofulöse Kinder und fand 18,4 Prozent hypoplastische Zahndefekte. »Inwieweit die Hypoplasien auf die spezifische Infektion oder auf die exsudative Diathese zurückzuführen oder als auf dem gemeinsamen Boden innersekretorischer Störungen entstanden anzusprechen sind, ist natürlich kaum abzugrenzen«. Seiner Ansicht nach können die Tuberkelbazillen am Zahnkeime direkt keine Kalkmißbildungen hervorrufen, sondern sie üben eine schädigende Wirkung auf die Regulatoren des Kalkstoffwechsels aus.

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch bemerken, daß Moral auch jetzt noch namentlich die Rachitis und congenitale Lues für das Auftreten der Schmelzdefekte verantwortlich macht, doch sind es nach Moral nicht diese beiden Erkrankungen allein, die Hypoplasien hervorrufen, denn »es kann nämlich jede Erkrankung, die eine Änderung des Kalkstoffwechsels bedingt oder im Gefolge hat, diesen so sehr beeinflussen«, daß es zu mangelhafter Kalkbildung im Schmelz kommt.

Meine bisherigen Ausführungen zeigen zur Genüge, daß die Frage der Schmelzhypoplasien seit vielen Jahrzehnten lebhaftes Interesse bei zahlreichen Forschern erweckte. Manche Theorie wurde aufgestellt und jeder Autor versuchte auf seine Art die Ätiologie der Hypoplasien zu ergründen. Wenn wir

aus den bis jetzt vorliegenden Forschungsergebnissen den Schluß ziehen wollen, so muß es wohl nach Ansicht der meisten Forscher als erwiesen angesehen werden, daß ein gewisser Zusammenhang besteht, zwischen den Schmelzhypoplasien und der Dysfunktion des innersekretorischen Drüsenapparates, namentlich der Epithelkörper und der Glandula thyreoidea.

Vor gut 40 Jahren erschienen in der medizinischen Literatur von Brown-Sequard zum ersten Male Berichte über Versuche mit Hodensaftinjektionen, die als Grundstein für die Lehre von der »Inneren Sekretion« gelten können. Welche Erfolge seitdem in der Erforschung der inneren Sekretion gezeitigt wurden, beweisen die zahlreichen Arbeiten und Abhandlungen, die bisher in den medizinischen Zeitschriften erschienen sind. Krankheiten, deren Ursache und Verlauf vollkommen unbekannt waren, können wir uns jetzt durch die Lehre von der inneren Sekretion erklären. Überall finden wir heute Zusammenhänge mit dem innersekretorischen Drüsenystem. Wie ich bei der Besprechung der einzelnen Theorien über die Ätiologie der Schmelzhypoplasien nachweisen konnte, hat die Lehre von der inneren Sekretion ebenfalls für die Zahnheilkunde große Bedeutung erlangt. Auch der Zahnarzt ist nun in der Lage, sich manches Krankheitsbild zu erklären, dessen Ätiologie vorher in Dunkel gehüllt war. In neuerer Zeit findet man verschiedentlich die Ansicht vertreten, daß auch geistige Minderwertigkeit auf Dysfunktion des innersekretorischen Drüsenapparates zurückzuführen ist. Ich erinnere nur an die Arbeiten von Kraepelin, Erben, Kaltenbach, Zimmermann und Berg, der schreibt, »daß innersekretorische Störung und Geisteskrankheit sehr häufig innig miteinander verbunden sind«.

In diesem Zusammenhang sind die Gebißuntersuchungen zu erwähnen, die bei geistig Anomalen vorgenommen wurden und die ergaben, daß geistig Minderwertige einen sehr hohen Prozentsatz Schmelzhypoplasien aufweisen. So fand Rohrer bei Patienten mit Dementia praecox 67,2 Prozent und Narten 58,8 Prozent Schmelzhypoplasien. Meyer konnte bei Encephalitis epidemica 23,81 Prozent und Koch 67,8 Prozent sog. rachitische Zahndefekte bei genuiner Epilepsie feststellen, wovon 9,2 Prozent auf Vorstadien, 27,5 auf weniger typische und 31 Prozent auf typische Hypoplasien entfallen. Weiter verzeichnete Maus bei

Idioten und Imbezillen 44,4 Prozent; bei Choreakranken fand Schütt 80,8 Prozent. Auch Ganter nahm Untersuchungen vor über Degenerationserrscheinungen bei Geisteskranken. Er fand, daß 97 Prozent der Idioten Kiefer- und Zahnanomalien aufwiesen. Lindenthal untersuchte 125 Kinder der Idiotenanstalt in Dalldorf. Nur bei 30 Kindern konnte er normale Zahn- und Kieferverhältnisse feststellen. An 200 Insassen der Irrenanstalt Bruckberg konnte auch Nathansen beobachten, daß bei Idioten Schmelzdefekte äußerst häufig in Erscheinung treten. Ziska fand Hypoplasien bei geistig Anomalen in 47 Prozent der Fälle und Kranz 32,2 Prozent in der Idiotenanstalt zu Idstein. Ebenfalls sehr hohe Werte errechnete Berg in seiner Arbeit über Gaumen- Zahn- und Kieferdegenerationen bei Kriminellen. Er fand bei Gewohnheitsverbrechern gegen eine Sache 73 Prozent, bei solchen gegen eine Person 85 Prozent und bei Sittlichkeitsverbrechern 65 Prozent Schmelzhypoplasien, während seine diesbzgl. Befunde bei Gelegenheitsverbrechern gegen eine Person nur 10,7 Prozent und bei Gelegenheitsverbrechern gegen eine Sache nur 7,4 Prozent betragen, also kaum von denen bei geistig Normalen abweichen. »Auf Grund dieser von mir gemachten Feststellungen ließe sich also wohl der Schluß ziehen, daß wir es bei den typischen Verbrechern mit Individuen zu tun haben, deren Organismus innersekretorisch gestört sein könnte«. (Berg.)

Ich möchte nun zu der Besprechung meiner eigenen Untersuchungenbefunde übergehen. Meine statistischen Erhebungen erstrecken sich auf 3500 Personen und zwar wurden in die Untersuchungsreihen wahllos alle Patienten aufgenommen, die in die Sprechstunde kamen. Außerdem wurden alle Schulkinder von 10 Jahren an in Rehna und den umliegenden Landstädten und Dörfern berücksichtigt. Um festzustellen, ob die Kinder größerer Städte mehr sog. rach. Zähne aufweisen als diejenigen auf dem Lande, untersuchte ich auch mehrere Schulen in Schwerin. Jeder Fall wurde nach Geschlecht, Alter, Zahl der bleibenden und der Milchzähne in meine Statistik eingetragen. Damit möglichst die Parallele zu der Arbeit von Schoengarth gewahrt wurde, trennte auch ich die gefundenen hypoplastischen Erscheinungen in der von Rohrer vorgeschlagenen Weise in die Gruppen Ia, I, II und III.

In Gruppe Ia habe ich alle Vorstufen der Hypoplasien zusammengefaßt, die erkennbar sind als kreidig=weiße bis gelblich=bräunliche Verfärbungen.

In Gruppe I finden sich die weniger typischen Schmelzdefekte, wie Querriffelungen, Rinnen, Dellen und Abfätze, die mit dem Fingernagel abzutaften sind.

In Gruppe II und III schließlich erscheinen die typischen Schmelzhypoplasien von punkt-, tüpfel- und becherförmigen Vertiefungen bis zu den ausgesprochen furchen- und bandartigen hypoplastischen Defekten.

Zur Bezeichnung der Zähne benutzte ich die ebenfalls von Rohrer angegebene Kreuzform.

$\frac{1}{\mid}$ = mittlerer Incisivus oben rechts.

$\frac{\mid}{4}$ = erster Prämolare unten links.

Untersucht wurden im ganzen 3500 Personen

Von diesen entfielen auf das			
männliche Geschlecht . . .	2121	»	
weibliche » . . .	1379	»	

Von diesen 3500 Untersuchten		
zeigten rach. Veränderungen .	662	»

Auf die einzelnen Gruppen entfallen:

Gruppe Ia (Vorstufen) . . .	117	»
-----------------------------	-----	---

Gruppe I (weniger typische Hypoplasien)	208	»
---	-----	---

Gruppe II und III (rein typische Hypoplasien)	337	»
---	-----	---

Die Prozentzahl der rachitischen Zahnveränderungen aller Gruppen beträgt	18,91 Prozent
--	---------------

Die Summe der rein typischen Hypoplasien (Gruppe II und III) ergibt	9,63 »
---	--------

Aus der Trennung der hypoplastischen Erscheinungen nach den Geschlechtern resultiert:

Von 2121 männlichen Personen entfielen auf:

Gruppe Ia	72
» I	134
» II und III	<u>212</u>
	418

Prozentzahl aller rachitischen Veränderungen der männlichen Unterfuchten 19,71 Prozent

Prozentzahl nur der Gruppe II und III 9,98 »

Bei 1379 weiblichen Unterfuchten zeigten sich in:

Gruppe Ia	45
» I	74
» II und III	<u>125</u>
	244

Prozentzahl aller rachitischen Veränderungen der weiblichen Unterfuchten 17,69 Prozent

Prozentzahl nur der Gruppe II und III 9,06 »

Über die Häufigkeit fog. rachitischer Zähne bei geistig Normalen fand ich in der Literatur nachfolgende Angaben, die ich zum Vergleich anführe. Schoengarth, der, wie bereits erwähnt, seine gefundenen Werte gleichfalls in eine Vorstufe und drei Grade einteilte, untersuchte an der Bergedorfer Zahnklinik 3065 Personen. Er konnte für alle hypoplastischen Veränderungen 19,33 Prozent und für die rein typischen Hypoplasien 9,5 Prozent feststellen. Busch untersuchte 2822 Patienten in der Poliklinik zu Berlin und fand 1–2 Prozent Hypoplasien. Nach seiner Angabe zeigen 2 Prozent der gesamten Menschen an den bleibenden Zähnen hypoplastische Schmelzdefekte. Ledeboer gibt als Ergebnis seiner diesbezgl. Untersuchungen an der städtischen Schulzahnklinik in Barmen 5,6 Prozent Hypoplasien an. Berten fand an der zahnärztlichen Poliklinik in Würzburg

6 Prozent und bei 3347 Schulkinder aus der Umgebung Würzburgs 7,3 Prozent sog. rachitische Zähne. Kaffowitz kommt auf Grund seiner Beobachtungen an 1753 Schulkindern zu einem Prozentfuß von 9,6 und bei 916 Untersuchungen seiner Klinik zu 10,9 Prozent. Gröschel fand bei Weißenburger Kindern 6 Prozent hypoplastische Schmelzdefekte. An einer großen Anzahl Hamburger Schulkinder untersuchte Krohn den Einfluß der Umwelt auf die Zähne und fand bezüglich der Hypoplasien bei 6jährigen 9 Prozent und bei 10jährigen 12 Prozent. Bei 2450 Erwachsenen und Kindern errechnete Fleischmann 4 Prozent, während er bei 26 Kinderleichen nur 2 Prozent sog. rach. Zähne feststellen konnte. Guillermin kam bei seinen Nachforschungen zu dem Ergebnis von 12 Prozent Schmelzhypoplasien und Neumann fand bei Schulkindern 13,4 Prozent. Allerdings stand ihm nur eine geringe Anzahl Fälle zur Verfügung, nämlich 284 Kinder. Außerdem stellte er Untersuchungen an bei 111 Kinderleichen und beobachtete 27,9 Prozent hypoplastische Zahndefekte. Derselbe Forscher konnte in der Berliner Poliklinik für Kinderkrankheiten bei 117 Kindern 18 Prozent sog. rach. Zähne buchen.

Bei Gegenüberstellung dieser Zahlen fällt die große Spannung auf, die zwischen den einzelnen Angaben besteht. Wir können diese Differenzen nur so erklären, daß die genannten Forscher bei ihren Untersuchungen keine einheitliche Abgrenzung der Schmelzdefekte vornahmen. Um aber zu annehmbaren Resultaten zu gelangen, ist es jedoch notwendig, daß bei derartigen statistischen Erhebungen auf gemeinsamer Basis vorgegangen wird. Haben wird doch in der von Rohrer ausgearbeiteten Einteilung in eine Vorstufe und drei Grade ein brauchbares Hilfsmittel. Im Rahmen meiner Arbeit sind die Befunde von Schoengarth für mich von besonderem Interesse. Für alle hypoplastischen Veränderungen konnte er, wie bereits erwähnt, 19,33 Prozent und für die rein typischen Hypoplasien 9,5 Prozent feststellen. Ich fand für die Gesamtzahl aller sog. rachitischen Zahnveränderungen 18,91 Prozent und für die typischen Schmelzdefekte 9,63 Prozent. Meine Gesamtbefunde decken sich demnach fast genau mit den Zahlen von Schoengarth.

Aus der nachfolgenden Tabelle sind die weiteren Untersuchungsergebnisse zu ersehen.

Geschlecht	Schoengarth		Drechsler	
	Prozentzahl aller rach. Veränderung.	Prozentzahl der typisch. Veränderung.	Prozentzahl aller rach. Veränderung.	Prozentzahl der typisch. Veränderung.
männlich	17,42	9,61	19,71	9,98
weiblich	21,22	9,39	17,69	9,06

Tabelle.1

Nach Geschlechtern getrennt, liegen Schoengarth's Werte bei den weiblichen Personen in Bezug auf die Prozentzahl aller Veränderungen höher als bei den männlichen Untersuchten; dagegen schneiden die typischen Hypoplasien bei den weiblichen schlechter ab. Dasselbe Bild ergaben meine Beobachtungen bezüglich der typischen Schmelzdefekte, während mein Prozentsatz der gesamten hypoplastischen Erscheinungen im Gegensatz zu Schoengarth's Berechnungen bei den Weiblichen geringer ist. Ähnliche Untersuchungen fand ich in der Literatur auch bei Krohn. An Hand ihrer statistischen Erhebungen kommt sie zu dem Ergebnis, daß Knaben und Mädchen gleich stark befallen werden. Zu denselben Resultaten kommt ebenfalls Gröschel bei seinen Untersuchungen der Weißenburger Kinder. Auf Grund dieser Betrachtungen kann wohl mit Recht angenommen werden, daß sowohl die weiblichen als auch die männlichen Individuen ungefähr in gleichem Maße Schmelzhypoplasien aufweisen.

Aus den in der Literatur angegebenen Zahlen über die Häufigkeit sog. rach. Zähne bei geistig Normalen ermittelte Rohrer einen durchschnittlichen Prozentsatz von 10 Prozent. Schoengarth und ich fanden, wie erwähnt, 19,33 bzw. 18,91 Prozent für alle hypoplastischen Zahnveränderungen. Dieser zweifellos beachtliche Unterschied zwischen den früheren Beobachtungen und den von Schoengarth und mir gemachten

Feststellungen ist nur so zu erklären, daß die älteren Forscher in ihre Untersuchungsreihen lediglich die mit bloßem Auge leicht erkennbaren hypoplastischen Veränderungen der Zähne aufnahmen. Das sind aber nur Hypoplasien des zweiten und dritten Grades, die wir zu 9,5 bzw. 9,63 Prozent fanden. Von diesem Standpunkt aus betrachtet, besteht dann allerdings zwischen den bisherigen und jetzigen Untersuchungsergebnissen bei geistig Normalen keine nennenswerte Differenz.

Beim Vergleich dieser Zahlen mit den Untersuchungsergebnissen bei geistig Anomalen tritt jedoch ein beträchtlicher Unterschied in Erscheinung. Aus den oben schon erwähnten Angaben über die Untersuchungen bei geistig Minderwertigen konnte ich einen Gesamtdurchschnitt von 60,8 Prozent errechnen. Im Gegensatz hierzu fand ich 18,91 Prozent Schmelzdefekte bei geistig Normalen. Somit kann ich durch meine Befunde die Resultate Schoengarths bestätigen, der schreibt, daß »die hypoplastischen Veränderungen bei geistig Nichtnormalen außerordentlich viel häufiger sind als bei Normalen«.

Um festzustellen, wie sich die Verhältnisse gestalten hinsichtlich der Häufigkeit der Hypoplasien zwischen den Kindern größerer Städte, den Kleinstadtkindern und den Kindern auf dem Lande, habe ich in Schwerin, dann in den Kleinstädten Gadebusch, Rehna, Grevesmühlen und außerdem in zahlreichen Dörfern der Umgegend die Schulkinder untersucht. Ich beschränkte meine Untersuchungen lediglich auf die Schüler und Schülerinnen, da auch die Einreihung der erwachsenen Bewohner dieser Städte und Landgemeinden aus verständlichen Gründen nicht möglich war. Untersucht wurden alle Kinder von 10—15 Jahren und aus dem Ergebnis für jede Schule die Prozentzahl sowohl der gesamt hypoplastischen Zahnveränderungen als auch der nur typischen Schmelzdefekte ermittelt. Was die Befunde der Landgemeinden betrifft, so habe ich in meiner Zusammenstellung nicht jedes einzelne Schuldorf aufgeführt, sondern nur den durchschnittlichen Prozentsatz angegeben. Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht meine Untersuchungsergebnisse.

Ortsbezeichnung	Anzahl der Untersuchten	Prozentzahl aller rach. Veränderung.	Prozentzahl der typisch. Veränderung.
A. Größere Städte Schwerin	1023	31,18	15,35
B. Kleinstädte Gadebusch	293	20,46	11,95
Rehna	241	17,84	10,37
Grevesmühlen	435	12,49	8,97
C. Landgemeinden 14 Dörfer	475	10,34	7,45

Tabelle 2

Danach steht Schwerin mit 31,18 bzw. 15,35 Prozent an der Spitze, dann folgen die Kleinstädte, deren durchschnittliche Prozentzahlen für alle rachitischen Veränderungen 16,93 und für die typischen Hypoplasien 10,49 betragen. An dritter Stelle folgen die Dorfschulen mit 10,34 und 7,45 Prozent.

Durch diese Untersuchungsreihe konnte ich also feststellen, daß die Kinder der Landgemeinden weniger hypoplastische Schmelzveränderungen aufweisen als die Kinder der kleinen Städte und diese wieder weniger als die Schulen größerer Städte.

Befonders interessant waren die Untersuchungen der Hilfsklassen. Solche Einrichtungen fand ich in Grevesmühlen und Gadebusch. Sie dienen dazu, die geistig minderwertigen Kinder aus der ganzen Schule zu vereinigen und sie in geeigneter Art für das spätere Leben vorzubereiten. Bei diesen Kindern konnte ich außerordentlich hohe Zahlen für hypoplastische Zahnveränderungen beobachten. So fand ich bei der Hilfsklasse in Gadebusch für die Gesamtzahl aller sog. rachitischer Schmelzveränderungen 58,89 Prozent und für die typischen Hypoplasien 41,18 Prozent. In Grevesmühlen belief sich die Zahl der typischen Schmelzdefekte auf 33,3 Prozent, während Vorstufen und weniger typischen Veränderungen nicht erkennbar waren.

Solche Schuluntersuchungen hat auch Kranz in Frankfurt a. M. vorgenommen. Zum Vergleich führe ich seine erhobenen Befunde an. In einer Landschule in der Nähe von Frankfurt untersuchte er 450 Kinder im Alter von 6—14 Jahren und fand bei 7 Prozent der Kinder Hypoplasien. In einem Vorort der genannten Stadt konnte er bei Kindern derselben Jahrgänge 13 Prozent hypoplastische Schmelzdefekte beobachten und im Zentrum der Stadt ergaben die Untersuchungen einer Volksschule 29,7 Prozent Hypoplasien, während die Hilfsschulen durchschnittlich 37,4 Prozent zeigten. Demnach kommt auch Kranz zu dem Ergebnis, daß bezüglich der Häufigkeit der Hypoplasien zwischen Stadt- und Landkindern erhebliche Unterschiede bestehen und zwar zeigen nach seinen Angaben auch die Stadtkinder wesentlich höhere Prozentzahlen für sog. rach. Zähne. Zur Begründung seiner Beobachtungen führt Kranz die von Hansemann beschriebenen Domestikationseinflüsse an, die »ihren Ausdruck in einer Schwäche der osteogenetischen Funktion und dann in der minderwertigen Anlage des Skelettes beim Neugeborenen finden«. Krohn glaubt, daß schlechthin durch unhygienische Verhältnisse dem Auftreten von Schmelzhypoplasien Vorschub geleistet wird. Durch meine Tätigkeit in einer Landstadt habe ich oft genug Gelegenheit, die hygienischen Verhältnisse auf dem Lande zu studieren und muß sagen, daß es häufig in dieser Beziehung wirklich recht traurig aussieht. Ich denke hierbei in erster Linie an die Behausungen der oft kinderreichen Schnitter- und Landarbeiterfamilien, die alles andere als hygienisch sind. Im Gegensatz hierzu steht aber die niedere Frequenz sog. rachitischer Zähne bei den Landkindern gegenüber den Schülern der Stadtschule. Es müssen hier also noch andere Faktoren am Werke sein, und ich vermute, daß Wohnungs- und Familienverhältnisse weniger einwirken, sondern in erster Linie die Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Czerny und Greve bestreiten allerdings, daß die Ernährung überhaupt einen Einfluß auf die Zahnanlagen ausüben kann. Durch zahlreiche Untersuchungen ist wiederholt festgestellt worden, daß namentlich die Nahrung der Städter nicht genügend Mineralstoffe aufweist, daß »die Städter vielmehr fast durchschnittlich an starkem Kalkmangel leiden«. Welchen Einfluß aber der Kalkstoffwechsel auf die

Bildung des Zahnschmelzes ausübt, zeigen die von Gottlieb und Fleischmann erschienenen Arbeiten.

Zu erwähnen wären in diesem Zusammenhang die von Roese angestellten Untersuchungen über den Kalkgehalt des Trinkwassers. Der Beschaffenheit des Bodens entsprechend (kalkarmes Urgestein oder kalkreiches Sediment) gewinnt man kalkarmes oder kalkreiches Wasser. Kalkreiches Wasser bezeichnen wir als »hart« und kalkarmes Wasser als »weich«. Gemessen wird der Kalkgehalt nach Härtegraden. Ein Härtegrad entspricht einem Kalkgehalt von 10 mg in einem Liter Wasser. Roese gelangt auf Grund seiner Untersuchungen zu der Annahme, daß in Gegenden mit weichem Wasser die Schmelzhypoplasien zahlreicher sind als in Landstrichen mit hartem Wasser. Diese Anschauung lassen jedoch Misch und Walkhoff nicht gelten und auch Lenox verwirft infolge seiner Beobachtungen in Südwestafrika die Kalkmangeltheorie.

Um diese verschiedenen Ansichten an meinem Untersuchungsmaterial nachzuprüfen, habe ich in der folgenden Tabelle die Trinkwasserbefunde der von mir untersuchten Städte in Beziehung gesetzt zu den ermittelten Prozentzahlen hypoplastischer Zahnveränderungen. Außerdem habe ich zwecks Gegenüberstellung die Ergebnisse aus Bergedorf angeführt.

Die Angaben über die Härtegrade des Trinkwassers stammen aus dem Landesgesundheitsamt Schwerin resp. aus dem Hamburger Hygienischen Staatsinstitut.

Orts- bezeichnung	Härte des Trinkwassers in deutschen Härtegraden	Gesamtzahl aller hypoplastischen Zahnveränderung.	Gesamtzahl der typischen Zahnveränderung.
Schwerin	7,42	31,18 Prozent	15,35 Prozent
Gadebusch	11,20	20,46 »	11,95 »
Rehna	13,52	17,84 »	10,37 »
Grevesmühlen	14,84	12,49 »	8,97 »
Bergedorf	11,00	19,33 »	9,50 »

Tabelle 3

Aus dieser Tabelle (Nr. 3) ist zu ersehen, daß Schwerin das kalkärmste Wasser und gleichzeitig die höchste Hypoplasiefrequenz aufweist, während Grevesmühlen mit seinem relativ kalkreichen Wasser die niedrigsten Werte hypoplastischer Zahnveränderungen zeigt. Dazwischen liegen, entsprechend den Härtegraden, die Städte Rehna und Gadebusch. Nur die Bergedorfer Zahlen lassen sich nicht ganz in diese Zusammenstellung einordnen, denn, obgleich Bergedorf bezüglich seines Trinkwasserkalkgehaltes unter Gadebusch liegt, zeigt es doch sowohl für die gesamt-rachitischen Zahnveränderungen als auch für die typischen Hypoplasien geringere Werte. Ich möchte diese Erscheinung aber damit erklären, daß bei den Untersuchungen in Bergedorf alle Jahrgänge von 10–60 Jahren berücksichtigt worden sind, indessen die Prozentzahlen der übrigen angeführten Städte sich nur auf die Schulkinder beziehen, von denen die 12- bis 15jährigen — wie wir später noch sehen werden — höhere Prozentzahlen aufweisen. Sieht man aus diesem Grunde von den Bergedorfer Zahlen ab, so ergibt sich aus meinen Untersuchungen die Schlußfolgerung: Je höher der Kalkgehalt des Trinkwassers, desto niedriger die Prozentzahlen der Schmelzhypoplasien. Um in dieser Frage jedoch ein abschließendes Urteil fällen zu können, sind meiner Ansicht nach viel umfangreichere Untersuchungen notwendig.

Bei meinen statistischen Erhebungen fiel mir schon nach der Untersuchung einiger Schulen auf, daß die Kinder von 12–15 Jahren besonders zahlreiche Schmelzhypoplasien aufweisen. Um die Häufigkeit hypoplastischer Schmelzdefekte in den einzelnen Lebensjahren zu ermitteln, habe ich in der nachfolgenden Tabelle alle Individuen, bei denen sog. rachitische Zähne festgestellt wurden, nach dem Alter zusammengestellt und von jedem Jahrgang die Prozentzahlen sowohl für alle hypoplastischen Zahnveränderungen als auch für die rein typischen Schmelzhypoplasien errechnet. Diese Tabelle (Nr. 4) veranschaulicht, daß besonders die 12–15 Jährigen weit mehr sog. rachitische Zähne aufweisen als die anderen Jahrgänge. Zu demselben Ergebnis kommt auch Schoengarth bei seinen Untersuchungen in Bergedorf und ebenfalls Gröschel kann von einer Zunahme der Schmelzdefekte infolge des Krieges berichten.

Lebensjahre	Gesamtzahl der Untersuchten	Prozentzahl aller hypopl. Veränderungen	Prozentzahl der typisch. Veränderungen
10	873	13,63	6,75
11	590	13,56	7,12
12	410	33,3	17,52
13	347	36,31	21,04
14	254	29,92	13,78
15	100	32,0	16,0
16	62	25,81	8,06
17	45	20,00	4,44
18	45	4,44	2,22
19	49	14,29	4,08
20	30	13,33	10,0
21	42	16,67	7,14
22	28	10,76	3,57
23	27	14,81	7,41
24	26	15,38	3,85
25	49	10,20	6,12
26	24	8,33	4,17
27	28	14,57	4,29
28	25	4,0	4,0
29	19	5,26	5,26
30—35	162	5,56	3,08
36—40	108	3,7	0,92
41—50	93	3,22	1,07
51—70	63	4,8	4,7
3500			

Tabelle 4

Der Grund hierfür liegt wohl darin, daß diese Jahrgänge, deren Geburt und erste Kindheit in die Kriegs- oder Nachkriegsjahre fielen, unter den damals herrschenden mangelhaften Ernährungsverhältnissen gelitten haben. Bekanntlich beträgt der durch-

schnittliche normale Kalkverbrauch eines erwachsenen Menschen ein Gramm täglich. Die nachstehende Zusammenstellung, wie sie vom Kriegsernährungsamt veröffentlicht worden ist, zeigt deutlich den geringen Kalkgehalt der damaligen Nahrung.

Die Zusammensetzung der Nahrungsmittel war im Sommer des Jahres 1916 folgende:

Brot	271 Gramm	0,04065 CaO
Kartoffeln	710 »	0,17775 »
Butter	18 »	0,66660 »
Milch	200 »	0,32000 »
Fisch und Fleisch	70 »	0,06160 »
Eier	0,3 Stück	0,01100 »
Zucker	32 Gramm	0,01920 »

Sa. 0,69655 CaO

Im Sommer 1917:

Brot	228 Gramm	0,03420 CaO
Kartoffeln	300 »	0,07500 »
Butter und Margarine	11,4 »	0,07500 »
Fisch und Fleisch	72 »	0,06336 »
Eier	0,07 Stück	0,00280 »
Zucker	26 Gramm	0,01560 »
Graupen und Teigwaren	9 »	zu vernachlässigen

Sa. 0,26596 CaO

Bei der Beurteilung vorliegender Frage möchte ich mich infolge meiner Beobachtungen der Ansicht von Schoengarth anschließen, welcher schreibt: »Zweifelloos bestehen hier Zusammenhänge, deren einzelne Glieder, Unterernährung verbunden mit Vitaminmangel, hierdurch vermehrte Krankheiten und innere Sekretionsstörungen und letztenendes eben auch die Schmelzhypoplasien find«.

Die Tabelle Nr. 5 stellt die von Rohrer angegebene Kreuzform dar und dient der Untersuchung, wie oft bei meinen statistischen Erhebungen die einzelnen Zähne von Schmelzhypoplasien befallen waren. Da die symmetrischen Zähne im Unter- wie im Oberkiefer nicht immer genau die gleichen Werte

aufwiesen, ging ich bei der Berechnung der Prozentfätze so vor, daß ich von jeder symmetrischen Zahngattung das Mittel feststellte und hiervon die Prozentzahlen bestimmte. Ich glaube auf diese Weise den tatsächlichen Verhältnissen am nächsten zu kommen. Wie aus dieser Tabelle zu ersehen ist, zeigen die Schneidezähne, Eckzähne und ersten Molaren die höchsten Zahlen hypoplastischer Schmelzdefekte. Diese Erscheinung wird ohne weiteres verständlich, wenn wir berücksichtigen, daß es gerade die Zahngattungen sind, deren Verkalkung während der ersten zwei Lebensjahre stattfindet. Prozentual ergibt sich bezüglich aller hypoplastischen Veränderungen für die einzelnen Zähne folgendes Bild:

Grupp. Ia	—	3	4	9	20	30	69	67	30	19	12	3	2	—
Grupp. I	—	76	4	3	38	40	138	136	38	40	3	4	76	—
Grupp. II/III	1	220	10	15	162	117	262	261	115	159	15	11	221	2
	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7
Grupp. II/III	2	225	13	16	194	239	259	259	236	193	19	16	226	2
Grupp. I	1	77	3	5	56	90	114	116	98	53	5	2	75	—
Grupp. Ia	—	3	2	6	20	23	27	28	22	23	7	1	5	—

Tabelle 5

Die einzelnen Zähne sind befallen:

<u>1 1</u>	in 70,45	Prozent	der Fälle	
<u>1 1</u>	„ 60,65	„	„	„
<u>2 2</u>	„ 53,47	„	„	„
<u>6 6</u>	„ 46,15	„	„	„
<u>6 6</u>	„ 45,17	„	„	„
<u>3 3</u>	„ 40,70	„	„	„
<u>3 3</u>	„ 33,05	„	„	„
<u>2 2</u>	„ 20,80	„	„	„
<u>4 4</u>	„ 4,38	„	„	„
<u>4 4</u>	„ 4,23	„	„	„
<u>5 5</u>	„ 2,69	„	„	„
<u>5 5</u>	„ 2,72	„	„	„
<u>7 7</u>	„ 0,38	„	„	„
<u>7 7</u>	„ 0,23	„	„	„

Den höchsten Prozentsatz erreichen hiernach die oberen mittleren Schneidezähne, an zweiter Stelle folgen die unteren mittleren Schneidezähne, dann kommen die seitlichen unteren Incisivi. Der Reihe nach folgen: die unteren ersten Molaren, die oberen ersten Molaren, die unteren Canini, die Eckzähne des Oberkiefers und hierauf erst die oberen seitlichen Schneidezähne. Diese relativ geringe Hypoplasiefrequenz an den seitlichen oberen Incisivi gibt Zsigmondi Anlaß zu der Ansicht, daß die Verkalkung der kleinen Schneidezähne des Oberkiefers später einsetzt als bei den oberen Eckzähnen. Berton läßt diese Behauptung nicht gelten, und Kranz äußert sich hierüber folgendermaßen: »Die Verkalkung beginnt an den höchsten Punkten der Dentinkeime, weshalb auch stets die Höcker der ein- sowohl als mehrhöckerigen Zähne, sowie auch der vorspringende zentrale Teil der mittleren Schneidezähne zuerst gebildet werden«.

Weit unter diesen Prozentzahlen folgen die ersten und zweiten Prämolaren und schließlich die zweiten Molaren, wobei

wie stets, die unteren Zähne häufiger von Hypoplasien befallen waren, als diejenigen des Oberkiefers. Eine Ausnahme von dieser Anordnung bilden allerdings die oberen mittleren Schneidezähne. Betreffs rachitischer Veränderungen an den Prämolaren und zweiten Molaren schreibt Koch: »An den Prämolaren und den zweiten Molaren sind nur selten Hypoplasien festzustellen«. Entgegen dieser Annahme kann ich auf Grund meiner Untersuchungsergebnisse sagen, daß rach. Schmelzdefekte an den Prämolaren gar nicht so selten auftreten. Bemerken möchte ich, daß auch Schoengarth an den kleinen Backenzähnen verschiedentlich Schmelzhypoplasien erblicken konnte.

Während sich die oben errechneten Prozentzahlen auf alle Schmelzdefekte beziehen, gebe ich nun nachfolgend eine Zusammenstellung über die Prozentfätze der nur typischen Hypoplasien und zwar in erster Linie deshalb, um diese Werte mit Schoengarth's vergleichen zu können, der in seiner Arbeit nur die Zahlen für die typischen hypoplastischen Erscheinungen anführt. Ich konnte für die sog. rachitischen Zähne der Gruppen II/III ermitteln:

$\frac{1}{1}$	77,6 Prozent	(70,4 Prozent)
$\frac{1}{1}$	76,9 „	(67,4 „)
$\frac{2}{2}$	70,5 „	(66,7 „)
$\frac{6}{6}$	66,9 „	(60,3 „)
$\frac{6}{6}$	65,4 „	(61,2 „)
$\frac{3}{3}$	57,4 „	(61,9 „)
$\frac{3}{3}$	47,6 „	(56,7 „)
$\frac{2}{2}$	34,4 „	(38,8 „)
$\frac{4}{4}$	5,2 „	(3,8 „)
$\frac{4}{4}$	4,4 „	(3,3 „)
$\frac{5}{5}$	4,5 „	(2,2 „)
$\frac{5}{5}$	3,1 „	(0,9 „)
$\frac{7}{7}$	0,6 „	(0,5 „)
$\frac{7}{7}$	0,4 „	(0,5 „)

Die eingeklammerten Zahlen bezeichnen die von Schoengarth gefundenen Prozentfätze. Bei Gegenüberstellung ist zu ersehen, daß wir im allgemeinen zu denselben Resultaten gelangt sind. Nur bezüglich der ersten Molaren und der unteren Canini weichen die Ergebnisse voneinander ab. Während meine Untersuchungen für die 6 Jahr-Molaren höhere Prozentzahlen als für die Eckzähne des Unterkiefers zeigen, kommt Schoengarth zur gegenteiligen Ansicht.

An Hand meiner Untersuchungen konnte ich feststellen, daß sich die Hypoplasien meistens an den Zähnen des Ober- und Unterkiefers in symmetrischer Anordnung finden und zwar verlaufen sie in schräger Linie von der Mitte der mittleren Incisivi über die seitlichen Schneidezähne zu den Kau spitzen der Eckzähne. Die Prämolaren weisen in den meisten Fällen keine Schmelzdefekte auf. In verstärktem Maße zeigen sie sich dann aber wieder an den 6 Jahr-Molaren, während der Schmelz der zweiten und dritten großen Backenzähne im allgemeinen intakt ist. Diese Lokalisation beobachten wir jedoch fast ausschließlich nur bei den typischen Hypoplasien, indessen die weniger typischen Schmelzdefekte sehr oft diese Anordnung vermiffen lassen. So finden sich in den leichten Fällen — um einige Beispiele herauszugreifen — die Defekte zuweilen nur an den Frontzähnen oder es sind lediglich die Schneidekanten der mittleren Incisivi und die Kauflächen der ersten Molaren befallen.

Um die Lokalisation der Hypoplasien genau studieren zu können, habe ich verschiedene Gruppen aufgestellt und mein gesamtes, von fog. rachitischen Schmelzdefekten befallenes Material in diese Lokalisationsgruppen eingeordnet. Nachfolgend bringe ich die aufgestellten Gruppen:

Gruppe A

Diese Gruppe entspricht der typischen Anordnung der Hypoplasien, wie ich sie bereits geschildert habe.

6	321		123	6
6	321		123	6

männlich: 91 III, 133 II, 134 II, 148 II, 324 II, 350 II, 355 II,
420 II, 492 III, 498 III, 517 II, 562 II, 1006 II,

1052 III, 1442 II, 1541 II, 1543 II, 1544 III, 1545 II,
1578 III, 1581 II, 1584 II, 1645 II, 1883 II, 2188 II,
2213 II, 2215 III, 2249 II, 2290 III, 2373 III, 2398 II,
2450 II, 2488 II, 2497 II, 2498 II, 2599 II, 2661 III,
2693 III, 2695 III, 2725 III, 2766 III, 2785 II, 2797 III,
3115 II, 3118 III, 3139 II, 3150 II, 3234 III = **48**,

weiblich: 25 II, 30 II, 217 II, 278 III, 333 II, 575 III, 625 II,
824 II, 1185 II, 1212 II, 1249 III, 1271 II, 1273 II,
1340 II, 1438 II, 1713 II, 1992 II, 3288 III, 3330 II,
3367 II, 3374 III, 3390 II, 3401 II, 3410 III, 3427 III,
3461 III = **26**.

Die Summe der Gruppe A beträgt **74**.

Ich konnte in dieser Zusammenstellung nur typische Schmelzdefekte beobachten. Die Prozentzahl beläuft sich auf 21,96.

Gruppe A 1

Diese Gruppe unterscheidet sich von der vorherigen dadurch, daß die seitlichen oberen Incisivi hier keine Hypoplasien aufweisen.

$$\begin{array}{r|rrrr} 6 & 3 & 1 & 1 & 3 & 6 \\ \hline 6 & 321 & 123 & 6 & & \end{array}$$

männlich: 580 II, 903 II, 1496 II, 1570 II, 1626 II, 1699 II,
1746 II, 1863 II, 1947 II, 2029 II, 2030 II, 2231 I,
2241 I, 2329 I, 2418 III, 2425 II, 2431 II, 2441 III,
2507 III, 2509 III, 2514 I, 2518 III, 2580 II, 2679 III,
2704 III, 2710 III, 2726 II, 2734 II, 2752 III, 2811 II,
2910 II, 2927 II, 2958 II, 3033 I, 3038 II, 3046 II,
3057 II, 3097 II, 3119 II, 3143 III = **40**,

weiblich: 302 II, 1040 II, 1048 II, 1241 II, 1426 II, 1595 II,
1900 II, 1990 II, 3299 I, 3315 I, 3338 III, 3339 II,
3371 III, 3376 III, 3387 III, 3406 II, 3454 III,
3481 III = **18**.

Gesamtzahl der Gruppe A 1 beträgt **58**.

Hiervon zeigen 7 Fälle keine rein typischen Hypoplasien. Für die typischen sog. rachitischen Veränderungen ergibt sich ein Prozentsatz von 15,1.

Gruppe A 2

Hier zeigen neben den Front- und Eckzähnen auch Prämolaren und Molaren Schmelzdefekte.

$$\begin{array}{r} 6\ 4\ 21\ |\ 12\ 4\ 6 \\ \hline 6\ 321\ |\ 123\ 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 654321\ |\ 123456 \\ \hline 7654321\ |\ 1234567 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 43\ 1\ |\ 1\ 34 \\ \hline 43\ 1\ |\ 1\ 34 \end{array}$$

männlich: 688 Ia/III, 819 III, 1473 III, 1542 III, 3101 II, 3122 Ia/III, 3169 Ia = **7**,

weiblich: 1038 III, 1478 III, 1482 III, 1483 III, 1511 III, 1717 III, 2050 III, 3383 I, 3408 I, 3475 III, 3497 III = **11**.

Summe aller Hypoplasien 18.

Davon erwiesen sich als typisch 15, was einer Prozentzahl von 4,5 entspricht.

Bei dieser Gruppe muß die causale Schädigung über das zweite Lebensjahr hinausgegangen sein, denn außer den Frontzähnen lassen auch die Prämolaren und Molaren Hypoplasien erkennen.

Gruppe A 3

Nun folgt eine Gruppe, die nur Hypoplasien an den oberen und unteren Schneidez- und Eckzähnen aufweist.

$$\begin{array}{r} 321\ |\ 123 \\ \hline 321\ |\ 123 \end{array}$$

männlich: 284 II, 466 II, 473 II, 607 Ia/II, 958 I, 1017 II, 1474 II, 1489 II, 1742 II, 1873 I, 1938 II, 1952 I, 2421 III, 2481 I, 2496 I, 2561 Ia, 2697 I, 2686 I = **18**,

weiblich: 100 II, 102 II, 103 II, 108 II, 149 II, 223 I, 280 I, 668 II, 861 II, 891 I, 954 II, 1210 II, 1280 II, 1294 II, 1481 II, 1548 II, 1621 I, 1647 II, 1718 II, 2059 I, 2099 II, 3440 I = **22**.

Gesamtzahl der hypoplastischen Erscheinungen 40, die rein typischen Hypoplasien sind 26 mal vertreten, das bedeutet in 7,7 Prozent der Fälle.

Gruppe A 4

Das Charakteristische dieser Gruppe besteht darin, daß zuweilen die oberen Eckzähne oder die unteren Schneidezähne nicht befallen sind.

$$\begin{array}{r|l} 6 & 21 \\ \hline 6 & 321 \end{array} \begin{array}{l} 12 \\ 6 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 6 & 321 \\ \hline 6 & 3 \end{array} \begin{array}{l} 123 \\ 6 \end{array}$$

männlich: 731 II, 898 II, 1389 II, 1391 II, 1402 II, 1494 II, 1728 II, 2084 I, 2129 I, 2174 I, 2180 II, 2340 II, 2406 I, 2411 II, 2422 III, 2503 I, 2768 III, 2782 II, 2836 III, 3037 II, 3117 II, 3163 II = **22**,

weiblich: 283 II, 340 I, 396 II, 538 II, 1555 I, 1562 II, 3345 II, 3468 III, 3479 II, 3491 I, 3494 III = **11**.

Summe 33.

Typische Hypoplasien 24 (7,4 Prozent).

Gruppe A 5

In dieser Zusammenstellung sind lediglich die Hypoplasien enthalten, die im Oberkiefer nur die mittleren Schneidezähne und ersten Molaren in Mitleidenschaft ziehen, während die Zähne des Unterkiefers in verschiedener Anordnung befallen sind.

$$\begin{array}{r|l} 6 & 1 \\ \hline 6 & 21 \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 6 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 6 & 1 \\ \hline 6 & 31 \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 6 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 6 & 1 \\ \hline 6 & 321 \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 6 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 6 & 1 \\ \hline 6 & 1 \end{array} \begin{array}{l} 1 \\ 6 \end{array}$$

männlich: 18 II, 120 II, 647 I, 1401 II, 1488 I, 1612 I, 1627 II, 1683 I, 1727 II, 1796 II, 1799 II, 1809 I, 1817 II, 1860 I, 2013 II, 2075 II, 2136 I, 2141 II, 2228 I, 2256 I, 2265 II, 2283 III, 2296 II, 2346 III, 2347 III, 2351 II, 2356 III, 2380 I/II, 2392 I, 2423 III, 2511 Ia/II, 2557 II, 2567 I, 2604 II, 2646 I, 2682 II, 2759 III, 2783 II, 2809 I, 2851 III, 2903 II, 2908 II, 2991 I, 3086 II, 3102 I, 3108 II, 3134 I, 3140 II = **48**,

weiblich: 311 II, 602 II, 787 II, 1253 I, 1434 II, 1802 II, 1853 II, 1905 II, 1921 II, 1986 II, 2039 II, 3386 II, 3419 I = **13**.

Summe der gesamten sog. rachitischen Veränderungen 61, hiervon sind als typisch zu bezeichnen 42, in Prozenten ausgedrückt 12,4.

Gruppe A 6

Hier sind die oberen und unteren Eckzähne frei von Defekten.

$$\begin{array}{r|l} 6 & 21 \\ \hline 6 & 21 \end{array} \begin{array}{l} 12 \\ 12 \end{array} \begin{array}{l} 6 \\ 6 \end{array}$$

männlich: 924 II, 1449 I, 2238 Ia, 2263 II, 2660 II, 2666 I, 2798 II, 2881 I, 3020 I, 3030 I, 3099 I, 3194 II = **12**,

weiblich: 541 II, 791 II, 1435 II, 1476 II, 1477 II, 1514 II, 1906 II, 3264 I, 3275 I, 3445 III = **10**.

Alle Fälle der Gruppe A 6 ergeben 22
typisch sind 13
oder 3,9 Prozent.

Während die obenstehenden Gruppen A—A 6 die typische Lokalisation der Schmelzdefekte teils stärker teils schwächer zum Ausdruck bringen, folgen nun Gruppen, bei denen diese typische Anordnung nicht zu beobachten ist.

Gruppe B 1

Nur die oberen mittleren Schneidezähne weisen hypoplastische Veränderungen auf.

$$\begin{array}{r|l} 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 \end{array}$$

männlich: 82 I, 118 Ia, 132 I, 249 I, 345 I, 431 Ia, 435 Ia, 442 Ia, 469 I, 519 Ia, 552 Ia, 568 Ia, 818 I, 874 Ia, 885 Ia/I, 969 I, 993 Ia/III, 1208 I, 1502 I, 2090 Ia, 2245 II, 2246 Ia, 2280 Ia, 2298 Ia, 2380 I, 2408 II, 2512 I, 2558 I, 2650 Ia, 2730 I, 2737 Ia, 2748 Ia, 3122 Ia/III, 3144 Ia = **34**,

weiblich: 152 I, 214 Ia, 217 Ia, 333 Ia/III, 388 I, 415 Ia, 528 Ia, 535 I, 587 Ia, 601 I, 628 Ia, 765 I, 839 I, 1083 Ia, 1165 Ia/I, 1199 I, 1213 Ia, 1515 Ia/I, 1538 Ia/I, 3304 Ia, 3379 I, 3430 I = **22**.

Summe der Gruppe B 1	56
Fälle mit typischen Hypoplasien	5
entspricht einem Prozentsatz von 1,5.	

Gruppe B 2

Hypoplasien, welche nur die oberen seitlichen Incisivi befallen.

$$\frac{2}{2}$$

männlich: 2166 Ia, 2173 Ia = **2**,

weiblich: 18 Ia, 41 Ia, 556 Ia, 765 Ia/I, 1158 Ia, 1162 Ia/I, 3225 Ia/I = **7**.

Fälle dieser Gruppe zeigen sich nur in geringer Zahl und zwar sind es im ganzen neun weniger typische, während rein typische Deformationen gar keine vorhanden sind.

Gruppe B 3

Lediglich die Eckzähne sind betroffen.

$$\frac{3}{3} \mid \frac{3}{3}$$

männlich: 80 II, 83 II, 297 I, 453 I, 652 I, 1576 I, 2508 I, 2511 Ia = **9**,

weiblich: 98 II, 145 II, 256 I, 1303 II, 2060 Ia, 3238 I = **6**.

Summe der Gruppe B 3	15
davon typisch	6 (1,8 Prozent).

Gruppe B 4

Die ersten Molaren allein zeigen fog. rachitische Schmelzdefekte.

$$\frac{6}{6} \mid \frac{6}{6}$$

männlich: 126 I, 381 I, 401 II, 547 I, 777 I, 823 I, 986 II, 1136 I, 1484 I, 2108 II, 2131 I, 2138 II, 2148 II, 2192 I, 2227 II, 2237 II, 2554 II, 2651 I = **18**,

weiblich: 53 II, 155 I, 682 II, 702 II, 1082 II, 1158 II,
1216 I, 1308 I 3229 Ia/I = **9**.

Gefamtzahl aller Hypoplasien 27

typische Veränderungen 13 (3,8 Prozent).

Gruppe B 5

In dieser Gruppe sind die oberen und unteren Schneidezähne befallen.

$$\frac{21}{21} \bigg| \frac{12}{12}$$

männlich: 136 I, 498 II, 851 Ia, 928 II, 1689 II, 2522 II,
2524 II, 2597 II, 2607 Ia, 2615 Ia, 2641 Ia, 2758 Ia,
2787 I, 2812 Ia, 3132 Ia, 3355 I = **16**,

weiblich: 17 I, 332 I, 362 I, 428 I, 527 Ia, 533 I, 536 I, 586 I,
728 I, 1164 II, 1235 II, 1357 I, 3253 Ia, 3413 I = **14**.

Summe der Gruppe B 5 30

typische Defekte 9

prozentual ergibt sich 2,7.

Gruppe B 6

Nur die mittleren Incisivi beider Kiefer lassen Hypoplasien erkennen.

$$\frac{1}{1} \bigg| \frac{1}{1}$$

männlich: 78 II, 135 I, 485 Ia, 1018 I, 1296 I, 1388 I, 1840 I,
2172 Ia, 2236 Ia, 2264 I, 2433 I, 2446 II, 2491 Ia,
2738 Ia, 2993 I = **15**,

weiblich: 95 II, 1046 I, 1103 I, 1165 I/Ia, 1440 Ia, 1606 I,
3368 Ia = **7**.

Gesamtsumme aller Fälle dieser Gruppe 22

davon typisch 3 (0,89 Proz.).

Gruppe B 7

Hier finden wir Hypoplasien nur an den Prämolaren und Molaren. Die Schneidez und Eckzähne sind verschont worden. Nachfolgende Anordnungen der Defekte waren zu entdecken.

$$\begin{array}{c|c} 4 & 4 \\ \hline 4 & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} 5 & 5 \\ \hline 4 & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} 54 & 45 \\ \hline 4 & 4 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c} 65 & 56 \\ \hline 65 & 56 \end{array}$$

männlich: 1581 Ia, 2297 I, 2417 I/II, 2650 I, 2689 Ia, 2736 I = **6**,

weiblich: 3249 Ia, 3320 I, 3322 Ia, 3398 I = **4**.

Summe der Gruppe B 7 10

typische Erscheinungen 1 (0,3).

Die Anordnung der Hypoplasien bei den Fällen dieser Gruppe läßt die Schlußfolgerung zu, daß die Störung erst nach dem zweiten Lebensjahre einsetzte.

Gruppe B 8

In dieser Gruppe sind alle Fälle zusammengestellt, bei denen im Oberkiefer allein hypoplastische Zahnveränderungen angetroffen wurden.

männlich: 56 II, 1613 I, 2654 II, 2709 I, 2713 Ia, 2729 Ia, 2790 I, 2947 II, 2990 I, 3060 Ia, 3151 Ia, 3166 Ia, 3206 I = **13**,

weiblich: 304 II, 3241 I, 3249 I, 3328 I, 3443 Ia, 3474 Ia = **6**.

Die gefamtrachitischen Fälle betragen 19

hiervon sind typische Defekte 4

entspricht einem Prozentsatz von 1,2.

Gruppe B 9

Entsprechend der vorstehenden Gruppe bringe ich nun eine Zusammenstellung der Fälle, bei denen lediglich im Unterkiefer Schmelzhypoplasien lokalisiert sind.

männlich: 123 II, 321 I, 1503 I, 1624 II, 2144 I, 2417 I/II, 2420 I, 2426 II, 2486 II, 2495 Ia, 2505 I, 2576 I, 2701 Ia, 2791 II, 2792 II, 2795 II, 2813 I, 3179 I = **18**,

weiblich: 419 I, 1538 I, 3247 I, 3377 II = **4**.

Summe dieser Gruppe

22

typisch

9 (2,7 Prozent).

Gruppe B 10

Hypoplasien, die entweder nur die oberen oder nur die unteren Schneidezähne befallen, habe ich in dieser Gruppe zusammenge stellt.

21 | 12

21 | 12

männlich: 491 I, 688 Ia, 1567 I, 1573 I, 2008 II, 2124 Ia, 2144 Ia, 2307 II, 2794 I, 2859 Ia, 2874 I, 2946 I, 3003 Ia, 3138 Ia = **14**,

weiblich: 923 Ia, 1509 I, 1515 I, 1538 I, 1555 I, 1845 Ia, 3271 Ia, 3276 Ia, 3315 Ia, 3349 Ia, 3434 I = **11**.

Die Gruppe B 10 umfaßt 25 Fälle, von denen nur 2 typisch find. (0,6 Prozent).

Gruppe B 11

Bei den Fällen dieser Gruppe treten nur an einzelnen Zähnen Schmelzdefekte in Erscheinung.

männlich: 231 Ia, 237 Ia, 285 I, 354 Ia, 606 Ia, 607 Ia, 672 I, 957 II, 961 II, 2149 Ia = **10**,

weiblich: 104 I, 364 Ia, 368 Ia, 639 Ia, 2093 Ia = **5**.

Insgesamt konnte ich 15 dieser Fälle feststellen.

Davon waren 2 typisch (0,6 Prozent).

In der Literatur fand ich Angaben über Hypoplasien an einzelnen Zähnen bei Baume, der den Grund hierfür in einer chronischen Periodontitis des entsprechenden Milchzahnes sieht. Auch Berten, Parreidt und Dieck haben solche vereinzelt in Erscheinung tretenden hypoplastischen Zahnveränderungen beobachtet. Letzterer schreibt hierzu: »Unterscheiden müssen wir

diejenigen Formen der mangelhaften Verkalkung und Schmelzbildung, welche auf eine rein lokale Urfache (Trauma, eitrige Periodontitis an einem Milchzahn) zurückzuführen sind und deshalb auch nur örtlich an dem einzelnen Zahne zum Ausdruck kommen«

Gruppe C

In dieser Gruppe finden wir alle Fälle vereinigt, die Hypoplasien nicht nur an bleibenden, sondern auch an Milchzähnen zeigen.

$$\frac{6V \text{ III} \mid \text{III V6}}{6V \text{ III} \mid \text{III V6}}$$

$$\frac{6V \mid V6}{6V \mid V6}$$

männlich: 183 II, 816 II, 993 Ia/III, 2193 II, 2204 II, 2216 I, 2906 III, 2915 III, 2916 I, 3126 II, 3183 II = **11**,

weiblich: 784 II, 1331 II, 2070 II, 3250 III = **4**.

Im ganzen fand ich 15 mal Hypoplasien an Milchzähnen und zwar in 13 Fällen = 3,9 Prozent typische Schmelzveränderungen.

Gruppe D

Hier sind die Fälle zusammengestellt, die in die vorherigen Gruppen nicht einzureihen waren.

männlich: 485 I, 971 Ia, 1744 I, 2172 I, 2220 I, 2232 II, 2247 I, 2260 II, 2261 II, 2296 I, 2303 II, 2345 II, 2349 III, 2370 I, 2403 II, 2405 III, 2440 Ia, 2443 III, 2482 II, 2493 Ia, 2513 I, 2515 II, 2602 II, 2680 II, 2711 II, 2720 I, 2722 Ia, 2731 I, 2744 II, 2786 Ia, 2808 I, 2812 Ia, 2818 II, 2819 II, 2839 II, 2844 Ia, 2876 Ia, 2889 I, 3025 Ia, 3055 II, 3142 Ia, 3173 I = **42**,

weiblich: 393 I, 600 Ia, 945 II, 947 I, 951 I, 1026 I, 1041 I, 1162 I, 2103 III, 3225 Ia, 3229 Ia, 3356 I, 3362 I, 3372 Ia/II, 3439 II, 3479 II = **16**.

Summe der Gruppe D 58

davon typische Hypoplasien 24 (7,1 Prozent).

Der besseren Übersicht wegen darf ich die verschiedenen Lokalisationsgruppen nochmals zusammenfassen. Die typischen fog. rachitischen Schmelzdefekte waren folgendermaßen auf die einzelnen Gruppen verteilt:

Gruppe A zeigte		21,9	Prozent
»	A 1 »	15,1	»
»	A 2 »	4,5	»
»	A 3 »	7,7	»
»	A 4 »	7,4	»
»	A 5 »	12,4	»
»	A 6 »	3,9	»
»	B 1 »	1,5	»
»	B 2 »	—	»
»	B 3 »	1,8	»
»	B 4 »	3,8	»
»	B 5 »	2,7	»
»	B 6 »	0,9	»
»	B 7 »	0,3	»
»	B 8 »	1,2	»
»	B 9 »	2,7	»
»	B 10 »	0,6	»
»	B 11 »	0,6	»
»	C »	3,9	»
»	D »	7,1	»

Insgesamt ergeben :

Die A-Gruppen		72,9	Prozent
»	B »	16,1	»
»	C-Gruppe	3,9	»
»	D »	7,1	»

Schoengarth errechnete für alle typischen Hypoplasien der A-Gruppen 70 Prozent und für die B-Gruppen 19,9 Prozent. In seiner C-Gruppe, die meiner Zusammenstellung D entspricht, fand genannter Autor 10,7 Prozent typische hypoplastische Schmelzveränderungen.

Die durchschnittlichen Untersuchungsergebnisse aus Bergedorf und Mecklenburg decken sich im allgemeinen auch bezüglich dieser Untersuchungsreihen.

In einer 1877 erschienenen Arbeit gibt Magitôt die Möglichkeit zu, daß auch die dritten Molaren von Schmelzhypoplasien befallen sein können. Hypoplasien an Weisheitszähnen fand Schoengarth in 4 Fällen. Es waren zwar keine Veränderungen im Sinne der Gruppe II/III, sondern nur weniger typische Schmelzdefekte. Ebenfalls Witzel konnte an Weisheitszähnen punkt- und furchenförmige Schmelzdefekte beobachten, und Koch fand an einem Weisheitszahn sog. rachitische Veränderungen, während nach Port-Euler die zweiten Molaren fast stets und die dritten Molaren immer frei von Schmelzhypoplasien bleiben. Ich habe bei meinen statistischen Erhebungen keine Hypoplasien an Weisheitszähnen entdecken können und bin der Ansicht, daß hypoplastische Defekte an diesen Zähnen äußerst selten sind. Allerdings rekrutiert sich mein Untersuchungsmaterial zum größten Teile aus Schulkindern, bei denen die dritten Molaren naturgemäß noch nicht durchgebrochen sind.

Im Anschluß hieran möchte ich nun noch zu der Frage der Schmelzhypoplasien an Milchzähnen Stellung nehmen und berichte zunächst über die in der Literatur gefundenen Angaben. Schon Magitôt nimmt an, daß auch das Milchgebiß rachitische Schmelzveränderungen aufweisen kann. Port-Euler äußern sich hierzu folgendermaßen: »Am Milchgebiß sind sie (die Hypoplasien) äußerst selten, besonders findet nur ausnahmsweise ein Befallensein einer größeren Anzahl von Milchzähnen statt. Etwas häufiger, aber auch noch sehr selten finden sich Hypoplasien an den zweiten Milchmolaren«. Die Autoren erklären ihren Standpunkt damit, daß die Schmelzbildung der Milchzähne im fötalen Leben beginnt und zur Zeit der Geburt abgeschlossen ist. Zur Bildung von Hypoplasien sind eingreifende Ernährungsstörungen unbedingt notwendig, die aber den Fötus zum Absterben in utero bringen. Ganz selten wird die Frucht diese heftigen Störungen überstehen und nur in den wenigsten Fällen wird es zu einem normalen Ende der Schwangerschaft kommen. Schulte schreibt: »Wir haben gesehen, daß die Milchschneidezähne stets von Hypoplasien verschont bleiben«. Panthen fand bei seinem geringen Untersuchungsmaterial von 74 Kindern im Alter von 2–6 Jahren an der Kleinkinderschule zu Homburg 3 Kinder mit Schmelzhypoplasien an den Milchzähnen, von denen das eine

an den oberen Milcheckzähnen und den unteren ersten Milchbackenzähnen rachitische Veränderungen aufwies. Krohn stellte bei ihren Untersuchungen in Hamburg fest, daß Hypoplasien an Milchzähnen, besonders den ersten und zweiten Milchmolaren, vorkommen, und Berten konnte bei 245 Fällen dreimal rachitische Schmelzdefekte an Milchzähnen konstatieren. Kantorowicz vertritt den Standpunkt, daß die zu Schmelzhypoplasien führenden Störungen erst extra uterin auftreten und deshalb eine Schädigung des Schmelzes der Milchzähne nicht möglich ist. Schoenlank erwähnt, daß wohl auch an Milchzähnen Hypoplasien auftreten, aber in ganz geringer Zahl. Er verleiht seiner Ansicht hierüber wie folgt Ausdruck: »Wenn dieselben so sehr selten an Milchzähnen aber auch an Prämolaren und zweiten bleibenden Molaren auftreten, so liegt dies eben darin, daß die gewohnheitsmäßig zu Schmelzhypoplasien führenden Erkrankung zu der Zeit, wo die einen verkalken, noch nicht eingesetzt haben, zur Verkalkungszeit der andern schon wieder abgeheilt sind«. Bei seinen Schuluntersuchungen fand Kranz in einem Vorort von Frankfurt 2,6 Prozent Hypoplasien an Milchzähnen, bei einer Volksschule im Zentrum der Stadt konnte er 8,7 Prozent und in den Hilfschulen sogar 11 Prozent rachitische Veränderungen an den Milchzähnen beobachten. Dies sind meiner Ansicht nach gewaltig hohe Zahlen und trotzdem schreibt er: »An den Milchzähnen sehen wir die Hypoplasien bedeutend seltener als an den bleibenden«. Entgegen diesen Beobachtungen vertritt Rohrer den Standpunkt, daß sog. rachitische Hypoplasien bei Milchzähnen nicht vorkommen. Schoengarth fand bei 3063 Untersuchungen nur in einem Falle Schmelzhypoplasien an Milchzähnen, und auch Feiler sagt, daß »an Milchzähnen bekanntlich Schmelzdefekte zu den Seltenheiten gehören«. Tholuck gibt an, daß nach Schulze und Pitts bei 0,3—1 Prozent aller Kinder Milchzahnhypoplasien auftreten und zwar meistens an den zweiten Milchbackenzähnen, seltener an den Eckzähnen und fast gar nicht an den Schneidezähnen des Milchgebisses.

Aus dieser Literaturangabe ist zu ersehen, daß zahlreiche Forscher sich auf diesem Gebiete betätigt haben und die Ansichten z. T. weit auseinandergehen.

In der Tabelle Nr. 6 habe ich meine Untersuchungsergebnisse hierüber zusammengestellt. An einem Material von 3500 Fällen fand ich, wie bereits bei den Lokalisationsgruppen angegeben, 15 mal Hypoplasien an Milchzähnen, was einem Prozentsatz von 0,42 entspricht. Verglichen mit den oben angeführten Angaben anderer Autoren, kommt mein Resultat den Werten von Schulze und Pitts am nächsten und liegt weit unter den errechneten Zahlen von Kranz.

Grupp. I	3									3
Grupp. II/III	9		2					2		9
	V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V
	V	IV	III	II	I	I	II	III	IV	V
Grupp. II/III	9		3					3		9
Grupp. I	2									2

Tabelle 6

An den Schneidezähnen konnte ich keine Hypoplasien beobachten, wohl aber fanden sich weniger typische und rein typische rachitische Schmelzdefekte an den zweiten Milchbackenzähnen, während die Milcheckzähne, sowohl des Ober- wie des Unterkiefers nur typische Hypoplasien aufwiesen. Vorstufen

waren niemals zu entdecken. Für die typischen Hypoplasien der einzelnen Zahngattungen ergaben sich nachstehende Prozentzahlen:

$\frac{V V}{V V}$	1,4 Prozent
$\frac{III III}{III III}$	1,4 »
$\frac{III III}{III III}$	0,5 »
$\frac{III III}{III III}$	0,30 »

In erster Linie zeigen also die zweiten Milchbackenzähne hypoplastische Schmelzdefekte, dann folgen die unteren Eckzähne und in kurzem Abstände die oberen Canini.

Soweit es mir die Verhältnisse erlaubten (in den Schulen war es leider nicht möglich) habe ich von den Gebissen mit fog. rachitischen Milchzähnen Abdrücke und Photos angefertigt, die sich bei der Originalarbeit befinden.

Abb. 1 zeigt deutlich Hypoplasien an dem linken oberen Milcheckzahn, dem zweiten Milchmolar und dem ersten großen Backenzahn. Abb. 2 stellt denselben Fall in der Aufsicht dar. Hier sind die hypoplastischen Schmelzdefekte beider Kieferseiten besonders gut zu beobachten. Als Vertreter der breiten Bandform ist die fog. rachitische Veränderung an dem Milcheckzahn des Unterkiefers auf Abb. 3 anzusehen. Zugleich sind bei diesem Falle auch der zweite Milchmolar und der 6-Jahrmolar betroffen. Wir sehen die hypoplastischen Deformitäten der letzteren Zähne auf Abb. 4 klar zu Tage treten. Der zweite Milchmolar ist allerdings stark cariös; aber die rachitischen Schmelzdefekte sind doch noch zu erkennen. Der Milcheckzahn auf Abb. 5 zeigt eine breite bandförmige Hypoplasie am mastikalen Drittel. Als fog. rachitische Zähne sind auf Abb. 6 der erste Milchmolar und auf Abb. 7 der obere Milcheckzahn, der zweite Milchmolar und der erste bleibende Molar anzusehen und zwar sind Abfätze und kleine Dellen zu beobachten.

Zusammenfassend lassen sich aus meiner Arbeit folgende Schlüsse ziehen:

Die Frage der Schmelzhypoplasien hat seit vielen Jahrzehnten das Interesse der Forscher in Anspruch genommen. Aus den zahlreichen Theorien über die Ätiologie der sog. rachitischen Zähne hat sich im Laufe der Jahre die Ansicht am meisten Anhänger erworben, welche das innersekretorische Drüsenystem als hauptsächlichstes ätiologisches Moment für diese Schmelzdefekte verantwortlich macht.

Bei meinen statistischen Erhebungen konnte ich für alle hypoplastischen Schmelzveränderungen 18,91 Prozent und für die rein typischen Hypoplasien 9,63 Prozent errechnen.

Meine Untersuchungsergebnisse decken sich fast mit denen aus Bergedorf. Verglichen mit den Prozentzahlen aus der Literatur, die als Durchschnittswert 10 Prozent ergaben, kann gesagt werden, daß die Beobachtungen aus Bergedorf und Mecklenburg von den früheren nicht wesentlich abweichen, wenn wir berücksichtigen, daß frühere Autoren die von Rohrer gegebene Einteilung der Schmelzhypoplasien nicht kannten und infolgedessen nur die mit bloßem Auge gut erkennbaren Hypoplasien in ihre Untersuchungsreihen aufnahmen. Diese Schmelzdefekte entsprechen aber nur den typischen sog. rachitischen Zahnveränderungen.

Weiter konnte auch ich feststellen, daß sowohl das weibliche als auch das männliche Geschlecht ungefähr in gleicher Stärke hypoplastische Erscheinungen an den Zähnen aufweisen.

Die Hypoplasiefrequenz bei geistig Anomalen ist ganz erheblich größer als bei den geistig gefunden Individuen. Während ich für geistig Normale 18,91 Prozent ermitteln konnte, fand ich in der Literatur bei geistig Minderwertigen einen Durchschnittsatz von 60,8 Prozent.

Die Kinder der Städte werden häufiger von Schmelzhypoplasien betroffen als die Landkinder. Den Grund hierfür möchte ich besonders in der Ernährung suchen. Wohnungs- und Familienverhältnisse scheinen weniger Einfluß auszuüben.

Durch Trinkwasseruntersuchungen konnte ich die von Roese vertretene Ansicht bestätigen, wonach in Städten mit

hartem Wasser die Häufigkeit sog. rachitischer Zahndefekte geringer ist als in Städten mit weichem Wasser. Ein abschließendes Urteil möchte ich allerdings nicht fällen, da mein Untersuchungsmaterial zu klein ist.

Diejenigen Kinder, deren Geburt und erste Kindheit in die Kriegs- und Nachkriegsjahre fallen, zeigen besonders häufig Schmelzhypoplasien. Die damals nur zur Verfügung stehende ungenügende und kalkarme Kost ist hiermit zweifellos in ursächlichen Zusammenhang zu bringen.

Die hypoplastischen Schmelzveränderungen sind durchaus nicht immer in der bekannten typischen Lokalisation zu finden, sondern — namentlich die Vorstufen und weniger typischen — erscheinen in den verschiedensten Anordnungen. Die typische Lokalisation zeigen gewöhnlich nur die Hypoplasien des zweiten und dritten Grades.

Hypoplasien an Milchzähnen waren in 0,42 Prozent zu beobachten, während die Weisheitszähne stets frei von sog. rachitischen Schmelzdefekten angetroffen wurden.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, Herrn Dr. med. Alfred Rohrer für die mir in so reichem Maße bewiesene Anregung und Förderung meiner Arbeit meinen herzlichsten Dank zu sagen.

Auch danke ich den Herren Schulräten und Schulvorständen für die freundliche Unterstützung bei der Untersuchung der Schulkinder.

Literaturverzeichnis.

- 1) Andrefen: Über Mineralisation und Remineralisation des Zahnschmelzes. D. M. f. Zahn. H. 4 und 14.
- 2) Berg Ernst: Über Gaumen- = Zahn- und Kieferdegenerationen bei Kriminellen. D. Z. W. 1927 Nr. 25/26.
- 3) Berg Ragnar: Enthält unsere Nahrung genug Mineralstoffe? Z. R. 1931 Nr. 2.
- 4) Berten: Die rachitischen Merkmale in der Mundhöhle. Zbl. Allg. Gesundheitspflege 1913 Nr. 11/12.
- 5) Black: Konservierende Zahnheilkunde. Deutsch von Dr. Hans Pichler, Berlin 1914.
- 6) Dieck: Hypoplasie der Zähne. Realenzysl. d. Gef. Zahnheilkunde 4. Aufl. 1909.
- 7) Eichler: Rachitische Veränderungen in der Mundhöhle. D. M. f. Zahnheilkunde 1913 Nr. 47.
- 8) Effer: Die Ätiologie der Rachitis. Münch. Med. Wochenschrift 1907 Nr. 17 S. 817.
- 9) Faesch: Kiefermessungen an Idioten. Schweiz. Vierteljahrsschrift f. Zahnheilkunde 1917 S. 137.
- 10) Falk: Beiträge zur Ätiologie der Zahnstellungsanomalien. Östr. Zeitschrift f. Stomatol. 1920 Nr. 12.
- 11) Feer: Lehrbuch für Kinderheilkunde. Jena 1922.
- 12) Feiler: Die sog. zirkuläre Caries. Deutsche Zahnheilkunde Heft 29 1913.
- 13) Fischer: Bau und Entwicklung der Mundhöhle des Menschen. Leipzig 1909.
- 14) Fischl: Der jetzige Stand der Pathogenese und Therapie der Rachitis. D. med. Wochenschrift 1922 Nr. 7.
- 15) Fleischmann: Die Ursache der Schmelzhypoplasien. Öst. Ung. V. f. Zahnheilkunde 1909 S. 866.
- 16) Fones: Bridgeport, Connect. Pränatale Ernährung und ihre Beziehung zur Zahnentwicklung.
- 17) Ganter: Über Degenerationszeichen (von Iris, Ohr, Zähnen usw.) bei Gefunden, Geisteskranken, Epileptikern und Idioten. Zeitschr. f. Psychiatrie. Band 70 1913 S. 224.
- 18) Gaßmann: Beiträge zur Erforschung der Rachitis. Schweiz. V. f. Zahnheilkunde 1913 Heft 4.
- 19) Gottlieb: Schmelzhypoplasie und Rachitis. Wiener V. f. Zahnh. 1920 H. 2.

- 20) Greve: Die erste Zahnung und deren Zusammenhang mit Allgemeinerkrankungen. D. Z. W. 1909 Nr. 18 S. 405.
- 21) Guillermin: Verhandlg. d. V. internat. zahnärztl. Kongr. Bd. 2 Berlin 1909.
- 22) Händel: Läßt sich eine in den Kinderjahren überstandene Rachitis in späterer Zeit noch an den Zähnen und Kiefern nachweisen? Zahnärztl. Rundschau 1924 S. 354.
- 23) Helbig: Zahnschmelzdefekte in ihren Beziehungen zu Rachitis und spasmophilen Zuständen des Säuglings und des späteren Kindesalter. Arch. f. Kinderheilkunde 1913 Band 60/61.
- 24) Helbig: Feftschrift für Baginsky. Stuttgart 1913.
- 25) Heymann: Über das Vorkommen und die Häufigkeit der echten und falschen Hutchinsonschen Zähne. Archiv für Dermatologie und Syphilis. Band 135 1921.
- 26) Hirsekorn: Hypoplasie und Dysplasie des Zahnschmelzes. D. Z. W. 1930 Nr. 14.
- 27) Hohlbaum: Beitrag zur Kenntnis der Epithelkörperfunktion. Ziegl. Beitr. 53 1912.
- 28) Jürgens: Gibt es bei Geisteskranken Zähne im Sinne der Hutchinsonschen Veränderung? Diff. Hambg. 1927.
- 29) Kantorowicz: Die Entstehung der Stellungsanomalien und die rachitischen Deformationen des Säuglingsgebisses. Zeitschrift für zahnärztl. Orthopädie 1926 H. 1/2.
- 30) Kantorowicz: Handwörterbuch der gesamten Zahnheilkunde.
- 31) Kaufmann: Über symmetrische Anomalien im Zahnsystem mit besonderer Berücksichtigung symmetrischer Karies an atypischen Stellen D. Z. W. 1930 Nr. 22.
- 32) Klein: Jahresbericht der städt. Schulzahnklinik zu Ulm a. D. für das Jahr 1908. D. Z. W. 1909 Nr. 19 S. 430.
- 33) Koch: Zahnanomalien bei genuiner Epilepsie. Diff. Hamburg 1925.
- 34) Kraepelin: Psychiatrische Klinik. Band III Leipzig 1921.
- 35) Kranz: Zur Ätiologie der Zahnstellung- bzw. Kieferanomalien. Zeitschr. f. Stomatologie 1920 Nr. 11 S. 438.
- 36) Kranz: Innere Sekretion in Beziehung zur Kieferbildung und Zahnentwicklung. Deutsche Zahnh. H. 32 1914.
- 37) Kranz: Über Zahnanomalien bei Kongenitaler Lues. Berlin 1920.
- 38) Kratz: Sind die Hypoplasien des Schmelzes am ersten bleibenden Molarzahn pathognomonisch für kongenitale Syphilis? D. Z. W. 1922 Nr. 27/28.
- 39) Krauß: Gebißuntersuchungen bei Manisch-Depressiven und Psycho-
pathen. D. Z. W. 1928 Nr. 23.

- 40) Kunert: Der Wert der modernen Ernährungsreformbestrebungen für Gesamtorganismus und Gebiß. D. M. f. Zahnh. 1915 S. 157.
- 41) Ledeboer: Jahresbericht der Städt. Schulzahnklinik Barmen im Etatsjahr 1913. Mitteilungen des Deutschen Zentralkomitees für Zahnpflege in den Schulen. 1914 Heft 2.
- 42) Lenox: (Windhoek, Südwestafrica) Beobachtungen über Diät und ihre Beziehung zur Zahnkrankheit. Eine weitere Betrachtung des Phosphors als in der zivilisierten Nahrung fehlendes Mineral.
- 43) Lindenthal: Degenerationsercheinungen an Kiefern und Zähnen mit besonderer Berücksichtigung der Beziehungen von Nerven und Geisteskrankheiten zum Zahnsystem. D. M. f. Zahn 1921.
- 44) Loew: Der Kalkbedarf von Mensch und Tier. München 1924. Verlag der ärztl. Rundschau Otto Gmelin.
- 45) Lohmann: Die Bedeutung der Kalksalze und Vitamine für die Gefunderhaltung und als Heilmittel. D. Zahn. Zeitg. 1919 Nr. 36.
- 46) Loos: Grundlagen der Zahn- und Kieferentwicklungsstörungen. Öftr. Zeitschr. f. Stomatologie 1920 Nr. 12 S. 483.
- 47) Maac: Beitrag zur Kalktherapie in der zahnärztlichen Praxis. Revista Dental (Havanna) 1923 Heft 8.
- 48) Matthes: Die rachitische Kieferdeformation und ihr Einfluß auf das Gebiß. Deutsche Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde 1881 Nr. 21 der ganzen Folge.
- 49) Mayrhofer: Kretinismus und Gebiß. Ergebn. der gef. Zahnheilkunde 1914 Band 4 Heft 2.
- 50) Meyer Hans: Über Kalktherapie. Öftr. Zeitschrift für Stomatologie 1920 Nr. 11.
- 51) Meyer-Euler: Pathohistologie der Zähne. Verlag Bergmann, München 1927.
- 52) Miller: Versuche und Beobachtungen über den Schwund harter Zahngewebe, der verschiedentlich als Erosion, Abrasion, chem. Abrasion, Denudation, keilförmiger Defekt usw. bezeichnet wird. D. M. f. Z. 1907 Heft 5.
- 53) Misch: Fortschritte der Zahnheilkunde: soziale Hygiene, Band 2 S. 477 1926.
- 54) Misch: Lehrbuch der Grenzgebiete der Medizin und Zahnheilkunde.
- 55) Moräl: Einführung in die Klinik der Zahn- und Mundkrankheiten. Leipzig 1920.
- 56) Nathanfen: Kiefer- und Zahnanomalien bei Idioten und Kretinen. Dissertation Würzburg 1922.
- 57) Panthen: Der Einfluß der Kriegsernährung auf die Entwicklung der Zähne. Dissertation Frankfurt a. M. 1922.

- 58) Petzel: Die endokrinen Drüsen in ihrer Beziehung zu Zahn- und Kieferanomalien. D. M. W. 1922 Nr. 7.
- 59) Port-Euler: Lehrbuch der Zahnheilkunde. München 1920.
- 60) Pflüger: Die Zahnveränderungen bei der Lues congenita. D. M. f. Z. 1925.
- 61) Riecke: Lehrbuch der Haut- und Geschlechtskrankheiten. Jena 1921.
- 62) Riettschel: Lehrbuch der Kinderheilkunde. Jena 1926.
- 63) Roefe: Über die mittlere Durchbruchzeit der bleibenden Zähne des Menschen. D. M. f. Z. 1909 S. 553.
- 64) Roefe: Die Wichtigkeit der Mutterbrust für die körperliche und geistige Entwicklung des Menschen. D. M. f. Z. XXIII Heft 3 1905.
- 65) Rohrer-Kalktenbach: Körperbauuntersuchungen bei Schizophrenen und Manischen Depressiven sowie Zahnuntersuchungen bei Schizophrenen. Z. f. Neurologie und Psychiatrie. 1928.
- 66) Rohrer: Deutsche Monatschrift für Zahnheilkunde 1925 Heft 23/24.
- 67) Rohrer: Numerierung der Zähne. W. Kl. W. 1921 Nr. 41.
- 68) Ruden: Über den Einfluß der Konstitution auf die Zahnentwicklung. D. Z. M. 1922. Nr. 27/28.
- 69) Rumfey: Diät, Kalziumstoffwechsel und die Zähne. British dental journ. 1921 Heft 2.
- 70) Schabad: Der Kalk in der Pathologie der Rachitis. B. kl. W. 1909 Nr. 20.
- 71) Schoengarth: Häufigkeitsfrequenz sogenannter rachitischer Zähne. Diff. Hamburg 1930.
- 72) Schoenlank: Beiträge zur Lehre von den Schmelzhypoplasien. D. M. f. Zahnheilkunde. 1920 H. 5.
- 73) Schulte: Beitrag zur Kenntnis der Schmelzhypoplasien. D. R. W. Nr. 14 XXV Jahrg. S. 157.
- 74) Schwifow: Untersuchungen über die Hutchinsonsche Trias. Diff. Hamburg 1926.
- 75) Tholuck: Die Behandlung der Milchzähne. Berlin 1929.
- 76) Tholuck: Skrophulose und Zahnkrankheiten. Münch. Med. Wochenschrift 1925 Nr. 20.
- 77) Türkheim: Zur Kenntnis der Schmelzhypoplasien. D. M. f. Z. 1914 Nr. 10.
- 78) Toyofuku: Ueber die parathyreoprive Veränderung des Rattenzahnes. Frkft. Zeitschrift f. Pathologie VII 2.
- 79) Urbantschitsch: Die Rachitis und ihr Einfluß auf das Milchgebiß. Öst. Ung. Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde 1907 S. 529.

- 80) Walkhoff: Die Vitamine in ihrer Bedeutung für die Entwicklung, Struktur und Widerstandsfähigkeit der Zähne gegen Erkrankungen. Berlin 1929.
- 81) Walkhoff: Biologische Studien über das Wesen der Zahnkaries. D. Z. Heft 42.
- 82) Weber: Zur Pathologie des oberen seitlichen Schneidezahnes. D. Z. W. 1924 Nr. 14.
- 83) Weidemann:
Lubowsky: Ergebnisse zahnärztl. Untersuchungen und Behandlung lungenkranker Kinder in den Kinderheilstätten vom Roten Kreuz in Hohenlychen im Jahre 1908 D. Z. W. 1909 Nr. 5.
- 84) Werkenthin: Lehrbuch der Gebißheilkunde. Berlin 1927.
- 85) Wießner: Die Mitleidenchaft der Knochen und Zahnsubstanz bei allg. Ernährungsstörungen. Östr. Ung. v. f. Z. 1907 S. 504.
- 86) Zsigmondi: Über die Hypoplasie des Schmelzes. Östr. Zeitschr. f. Stomatol. 1908 Nr. 12.
- 87) Zimmermann: Anomalien der Kiefer und Zähne und ihre Beziehung zur Idiotie. Zeitschrift zur Erforschung des Schwachsinns. 1915.
- 88) Zinßer: Zahnhypoplasien und Syphilitis congenita M. M. W. 1921 Heft 48.

Lebenslauf.

Ich, Georg Wilhelm Arthur Drechsler, evang. Konfession, wurde am 8. September 1898 als Sohn des Oberingenieurs Arthur Drechsler und seiner Ehefrau Ida, geb. Siegert, in Berlin geboren. Ich besuchte die Hanfeschule zu Bergedorf und die Oberrealschule in Hamburg-Eppendorf. Von 1917 bis zur Beendigung des Krieges war ich Soldat. Nach Rückkehr aus dem Felde widmete ich mich dem Studium der Zahnheilkunde an der Hamburgischen Universität, wo ich 1921 die zahnärztliche Vorprüfung ablegte und nach bestandenem Staatsexamen im Jahre 1923 die Approbation als Zahnarzt erlangte. Seit fünf Jahren bin ich in Rehna in Mecklenburg als Zahnarzt tätig.

